3423

E. Bibliotheca
C. Ph. F. Martii.

PRODROMUS
PLANTARUM
CAPENSIUM,

QUAS,

IN

PROMONTORIO

BONÆ SPEI AFRICES,

ANNIS 1772—1775,

COLLEGIT

CAROL. PET. THUNBERG.

PARS PRIOR.

MISSOURI BOTANICAL
GARDEN LIBRARY

UPSALIÆ,

LITTERIS VIDUÆ DIRECT. JOH. EDMAN, 1794.

HARVARD UNIVERSITY HERBARIUM.

MISSOURI BOTANICAL
GARDEN LIBRARY

Rare book
QK403.9
.T59
1794a
v. 1

1872, June 18.

$0.38.

4 August 1964

VIRO NOBILISSIMO,

DOMINO

NICOL. LAUR. BURMANNO,

MED. DOCT. ET PRACT. AMSTELÆDAMENS.
NEC NON BOTAN. PROFESSORI
ILLUSTRISSIMO, CELEBERRIMO!

MEO PRÆ ALIIS PATRONO ET FAUTORI
LONGE OPTIMO!

ITINERIS AFRICANI ET JAPONICI MEI
AUCTORI FAVENTISSIMO!

IN

ÆTERNUM GRATISSIMÆ MENTIS TESTIMONIUM

HASCE PAGELLAS, UTI DEBUI, SACRAS VOLUI

C. P. THUNBERG.

PRÆFATIO.

Poſtquam prælum reliquiſſet Anno 1784 Flora mea Japonica, ſedulo allaboravi, ut etjam prodiret, quam primum fieri poſſet, Flora Capenſis. Acceſſi ad Promontorium Africes auſtrale, bonæ ſpei communiter dictum Anno 1772, ibique per tres annos commoratus, ſub itineribus variis usque ad remotiores & interiores hujus terræ regiones inſtitutis, plantarum numerum haud exiguum collegi, examinavi, deſcripſi. Hoſce deſcriptiones plantarum cum adjunctis nonnullarum iconibus, locis natalibus, tempore florendi, uſu, ceteris, ob copiam in plura volumina diſtributas, edendi animus quidem fuit; Sed per plures annos occaſio mihi defuit prelo illas committendi, donec ex meis Amicis D. SPENER, Berolinenſis celebris Bibliopola hanc curam, ſumtusque in ſe ſuſcipere voluit. Cum vero opus tantæ molis non feſtinanter prelum relinquere poſſit, Prodromum hunc

hunc interim divulgare decrevi, particulis duabus ſenſim edendis conſtantem, ut ſit inſtar Supplementi Syſtematis ſexualis, atque demonſtret, quas Gazas continet ipſa Flora, decenter & ſuccinctè deſcriptas.

Deſcripſerunt Varii Auctores Plantas Capenſes, ut PLUKENET, *BOERHAVIUS, HERMANNUS, BREYNIUS, COMMELINUS, BURMANNUS, LINNÆUS, BERGIUS, JACQUINUS, Alii; peregrinatores quoque varii collegerunt eumque Botanicis communicarunt Africanas plantas, ut HEURNIUS, HERMANNUS, OLDENLANDUS, HARTOGIUS, KOENIGIUS, AUGE, SPARRMANNUS, Comes meus MASSON, PATESSON & Ego; deſideratur vero adhuc proprie ſic dicta Flora Capenſis, quæ dives non minus eſt, quam quidem pulchra & ſingularis. Reduxi non nulla Genera ante conſtituta, jam accuratius ad examen revocata; nova pauca creavi, timens ſemper naturam turbare, genera naturalia lacerare & hæc multiplicando Scientiam incertam reddere & difficilem. Excluſi plantas, ex Europa huc translatas, hoc tempore licet ſpontaneas, ne indigenæ cum advenis & cultis confunderentur.*

Acci-

Accipe, L. H. hoc aliquot paginarum opuſculum, plurium vero annorum gravioris laboris opus, labores meos juveniles & fructus maturioris ætatis! Accipe, ut ante ſveviſti, benigne & amice, huncce Floræ Capenſis Prodromum, Cujus Auctor a teneris adeo Hiſtoriæ Naturali fuit adictus, ut totum ſe & ſuas fortunas in hujus amabilis & utilis Scientiæ incrementum conſecraverit.

NOVORUM GENERUM
CHARACTERES ESSENTIALES.

MONANDRIA.

I. DAHLIA. ♂. Cal. ſquama. Cor. 1-phylla.
♀. Cal. ſquama. Cor. o. Capſ. 1-locul.
Monandria, Monogynia.

II. PHELYPÆA. ♂. Cal. o. Cor. 6-partita.
♀. Cal. o. Cor. 6-part. Piſt. 1. Capſul. 7-locularis.
Monandria, Monogynia.

DIANDRIA.

III. DISA. Cor. ringens: petalum unum ſaccatum, petala duo includens!
Cornu anticum.
Diandria, Monogynia.

IV.

MISSOURI BOTANICAL
GARDEN LIBRARY

IV. ANCISTRUM. Cal. 5-phyllus. Cor. o.
Stigma penicilliforme. Nux.
Diandria, Monogynia.

TRIANDRIA.

V. WITSENIA. Cor. 6-partita, cylindrica.
Stigma emarginatum.
Triandria, Monogynia.

VI. GALAXIA. Cor. 1-petala, 6-fida: tubo capillari.
Stigmate multipartito.
Staminibus monadelphis.
Triandria, Monogynia.

VII. ACHARIA. ♂. Cal. 2-phyllus. Cor. 3-fida.
♀. Capſ. 1-locularis, 3-ſperma.
Triandria, Monogynia.

VIII. ELEGIA. ♂. Cal. 6-glumis, inæqualis. Cor. o.
♀. Capſula 3-locularis.
Triandria, Monogynia.

IX. WILDENOWIA. ♂. Cal. multiglumis. Cor. 6-petala.
♀. Nux 1-locularis.
Triandria, Monogynia.

X. CHLORIS. Cal. biglumis. Cor. hermaphroditi bivalvis, maſculi 1-valvis: ariſta terminali.
Nectarium diphyllum.
Triandria, Digynia.

TETRANDRIA.

XI. CURTISIA. Cal. 4-fidus. Cor. 4-petala.
Germen inferum. Bacca 1-ſperma.
Tetrandria, Monogynia.

XII. SCHREBERA. Cal. 5-dus. Cor. 4-petala.
Drupa diſperma.
Hartogia. Nov. Plant. Gen. P. 5. p. 87. c. fig.
Tetrandria, Monogynia.

XIII. MONTINIA. ♂. Cal. 4-partit. Cor. 4-petala.
♀. Cal. 4-partit. Cor. 4-petala.
Stigmata 2. Capſ. 2-locuſaris.
Tetrandria, Monogynia.

XIV. MONETIA. Cal. 4-fidus. Cor. 4-petala.
Germen ſuperum. Bacca.
Tetrandria, Monogynia.

XV. CAVANILLA. ♂. Cal. 4-phyllus. Cor. o.
♀. Styl. radiatus. Nux.
Tetrandria, Monogynia.

XVI. LAUROPHYLLUS. ♂. Cal. ſubtetraphyllus. Cor. o.
♀. Germen ſuperum.
Tetrandria, Monogynia.

XVII. BOSCIA. Cal. 4-dentatus. Cor. 4-petala.
Capſul. 4-locularis.
Tetrandria, Trigynia.

PENTANDRIA.

XVIII. RETZIA. Cal. 5-partitus. Cor. cylindrica, 5-fida.
Stigma bifidum. Capſula bilocularis.
Pentandria, Monogynia.

XIX. STAVIA. Cor. ſupera, 5-petala.
Stam. calyci inſerta. Styl. bifidus.
Pentandria, Monogynia.

XX. CALODENDRUM. Cal. 5-partitus. Cor. 5-petala.
Nectarium 5-phyllum. Capſ. 5-locularis.
Pentandria, Monogynia.

XXI.

CHARACTERES ESSENTIALES.

XXI. STRELITZIA. Cor. 3-petala.
Nectarium h-ſtatum!
Capſul. 3-locularis.

Pentandria, Monogynia.

XXII. VAHLIA. Cal. 5-phyllus. Cor. 5-petala.
Germen inferum. Capſul. 1-locularis.

Pentandria, Digynia.

XXIII. CUSSONIA. Cal. 1 phyllus, ſubdentatus. Cor. 5-petala. Involucrum o. Semina bilocularia.

Pentandria, Digynia.

HEXANDRIA.

XXIV. GETHYLLIS. Cor. 6-partita: tubo filiformi.
Germen inferum. Bacca oblonga, polyſperma.
Papiria Act. Lundenſ.

Hexandria, Monogynia.

XXV. MASSONIA. Cor. 6-petala, nectario inſerta.
Nectarium inferum. Capſ. 3-locularis.

Hexandria, Monogynia.

XXVI. MAUHLIA. Cor. infera, 6-partita: limbo æquali.
Capſul. 3-locularis.

Hexandria, Monogynia.

XXVII. LANARIA. Cor. 6-partita, lanata.
Stigma trifidum. Capſula 3-locularis.
Hyacinthus lanatus. Linn. Syſt. Veg. XIV. p. 336.
Lanaria. Hort. Kevenſ. Aiton. P. I. p. 462.

Hexandria, Monogynia.

XXVIII. LACHENALIA. Cor. 6-partita: laciniis tribus exterioribus brevioribus.
Germen ſuperum. Capſ. 3-locularis.
Phormium. Nov. Plant. Gener. P. 5. p. 93.

Hexandria, Monogynia.

XXIX.

NOVOR. GENER. CHARACT. ESSENTIALES.

XXIX. SANSEVIERIA. Cor. 6-fida: laciniis erectis. Germen ſuperum. Bacca.

Hexandria, Monogynia.

XXX. EHRHARTA. Cal. biglumis. Cor. duplex. Nectarium patheriforme.

Hexandria, Monogynia.

DECANDRIA.

XXXI. EKEBERGIA. Cal. 4-partitus. Cor. 4-petala. Nectar. ſertiforme. Bacca 5-ſperma.

Decandria, Monogynia.

XXXII. SCHOTIA. Cal. 5-dus. Cor. 5-petula. Legumen pedicellatum.

Decandria, Monogynia.

XXXIII. AUGEA. Cal. 5-partitus. Cor. 0. Nectar. 10-dentatum. Capſul. 10-loculari

Decandria, Monogynia.

CLASSIS I.

MONANDRIA.

MONOGYNIA.

SALICORNIA.

S. fruticosa, erecta articulis subæqualibus obtusis approximatis. *fruticosa.*

DAHLIA.

D. Act. Hist. Nat. Hafniens. Tom. 2. Vol. 1. p. 133. t. 4. *crinita.*

PHELYPÆA.

P. Nov. Plant. Gener. P. 5. p. 91. *sanguinea.*

CLASSIS II.

DIANDRIA.

MONOGYNIA.

OLEA.

europæa. O. foliis lanceolatis, panicula trichotoma.
capenſis. O. foliis ovatis integris, panicula terminali trichotoma decompoſita.

JASMIMUM.

capenſe. J. foliis oppoſitis ternatis ovatis acuminatis, caule erecto angulato.
glaucum. J. foliis oblongis mucronatis.
Nyctanthes glauca. Linn. Suppl. 82. Syſt. 52.

VERONICA.

anagallis. V. racemis lateralibus, foliis lanceolatis ſerratis, caule erecto.
Veronica Anagallis aquatica. Linn. Sp. Pl. 16. Syſt. 59.

OPHRYS.

alata. O. labello trifido: lacinia media breviſſima, caule polyphyllo.
triphylla. O. labello triangulari baſi dentato, caule triphyllo.
caffra. O. labello biſido, caule triphyllo.
volucris. O. labello exciſo ovato, foliis caulem vaginantibus oblongis.
inverſa. O. labello biſido integro, foliis enſiformibus.
bicolor. O. labello exciſo-biſido, foliis lineari-enſiformibus.
atrata. O. labello cordato ſpathulato, foliis lineari-ſetaceis.

ARETHUSA.

A. caule diphyllo unifloro, foliis lanceolatis. *capenſis.*
A. caule diphyllo, foliis linearibus, ſpica ſecunda. *ſecunda.*
Ophrys circumflexa. Linn. Sp. Pl. 1344. Syſt. 814.
A. caule diphyllo, foliis ovatis villoſis ciliatis. *villoſa.*
A. caule diphyllo, foliis oblongis acuminatis, *alaris.*
ſpica ſecunda.
Ophrys alaris. Linn. Suppl. 404. Syſt. 814.
A. caule polyphyllo, foliis criſpis, ſpica multiflora denſa. *criſpa.*

SERAPIAS.

S. folio radicali enſiformi ſtriato, floribus ſubracemoſis. *pedicellata.*
Satyrium pedicellatum. Linn. Suppl. 402. Syſt. 812.
S. folio radicali lineari, floribus ſpicatis cernuis. *tabularis.*
Satyrium tabulare. Linn. Suppl. 402. Syſt. 811.
S. foliis radicalibus ſubternis enſiformibus ſtriatis, ſpica ovata. *aculeata.*
Satyrium aculeatum. Linn. Suppl. 402. Syſt. 811.
S. foliis caulinis lanceolatis, ſpica faſtigiata. *miſaleuca.*
Ophrys bivalvata. Linn. Suppl. 403. Syſt. 814.
S. foliis caulinis lanceolato-ſetaceis, ſpica ovata, floribus perpendicularibus. *patens.*
Ophrys patens. Linn. Suppl. 404. Syſt. 814.

LIMODORUM.

L. foliis oblongis equitantibus, floribus ſecundis, corpu ſiliformi longiſſimo. *longicorne.*
Orchis filicornis. Linn. Suppl. 400. Syſt. 811.
L. foliis linearibus erectis, floribus cernuis. *hians.*
Satyrium hians. Linn. Suppl. 404. Syſt. 812.

barbatum. L. foliis enſiformibus falcatis, ſpica ovata, ſcapo flexuoſo.
Serapias capenſis. Linn. Mant. 293. Syſt. 816.

giganteum. L. foliis enſiformibus recurvis, floribus ſpicatis remotis.
Satyrium giganteum. Linn. Suppl. 402. Syſt. 811.

triſte. L. foliis enſiformibus erectis, ſcapo ramoſo, floribus racemoſis.
Satyrium triſte. Linn. Suppl. 402. Syſt. 811.

ORCHIS.

pectinata. O. labello multipartito: laciniis capillaribus, folio orbiculato ciliato.
Orchis Burmanniana. Linn. Spec. 1334. Syſt. 674.
Arethuſa ciliaris. Linn. Suppl. 405. Syſt. 817.

hiſpida. O. labello 5-partito: laciniis linearibus, folio rotundo hiſpido.
Orchis hiſpidula. Linn. Suppl. 401. Syſt. 809.

ſecunda. O. labello 3-partito: laciniis filiformibus, foliis ovatis glabris, ſpica ſecunda.

ſpecioſa. O. labello 3-partito: laciniis flexuoſis, foliis ovatis.

DISA.

longicornis. D. cornu cylindrico longiori.
Diſa longicornu. Linn. Suppl. 406. Syſt. 817.

maculata. D. cornu breviſſimo ſcrotiformi.

SATYRIUM.

grandiflorum. S. galea unicalcarata, labello lineari-ſetaceo, foliis enſiformibus, ſpica pauciflora.
Diſa grandiflora. Linn. Suppl. 406. Syſt. 817.

ſecundum. S. galea unicalcarata, labello filiformi, ſpica ſecunda, caule flexuoſo.
Diſa racemoſa. Linn. Suppl. 406. Syſt. 817.

S. ga-

S. galea unicalcarata, labello lanceolato cuſpi- *ferrugineum.*
dato, ſpica multiflora.

S. galea unicalcarata, labello lanceolato, foliis *rufeſcens.*
enſiformibus diſtinctis.

S. galea unicalcarata, labello lanceolato, foliis *excelſum.*
lanceolatis.
Orchis tripetaloides. Linn. Suppl. 398. Syſt. 807.

S. galea unicalcarata, cornu biſido, labello lan- *biſidum.*
ceolato.

S. galea unicalcarata, labello lanceolato, foliis *ſagittale.*
lanceolatis, ſpica laxa.
Orchis ſagittalis. Linn. Suppl. 399. Syſt. 807.

S. galea unicalcarata, labello lineari apice dila- *draconis.*
tato. ſpica faſtigiata.
Orchis draconis. Linn. Suppl. 400. Syſt. 807.

S. galea unicalcarata, labello lineari, foliis di- *cernuum.*
ſtinctis undulatis.

S. galea unicalcarata, labello lineari-oblongo, *tenellum.*
foliis flexuoſis.
Orchis tenella. Linn. Suppl. 400. Syſt. 807.

S. galea unicalcarata, labello lineari-lanceo- *tortum.*
lato, caule flexuoſo.

S. galea unicalloſa, labello ovato, foliis oblon- *cylindricum.*
gis nervoſis.

S. galea unicalcarata, labello ovato integro, *cornutum.*
foliis diſtichis.
Orchis cornuta. Linn. Spec. 1330. Syſt. 807.

S. galea unicalcarata, labello ovato criſpo, *flexuoſum.*
caule flexuoſo.
Orchis flexuoſa. Linn. Spec. 1331. Suppl. 398. Syſt. 807. 808.

S. galea unicalcarata, labello petiolato ovato *ſpathulatum.*
trifido, foliis linearibus.
Orchis ſpathulata. Linn. Suppl. 396. Syſt. 807.

S. galea unicalcarata, labello ovato multiparti- *barbatum.*
to, foliis lineari-filiformibus.
Orchis barbata. Linn. Suppl. 399. Syſt. 807.

bicorne. S. galea bicalcarata: cornubus filiformibus, foliis rotundatis cucullatis.
Orchis bicornis. Linn. Spec. 1330. Syst. 807.

orobanchoides. S. galea bicalcarata: cornubus obtusis brevibus, foliis ensiformibus distichis.

pumilum. S. galea bicalcarata: cornubus obtusis brevibus, foliis ovatis acutis.

striatum. S. galea bicalloſa, foliis ovatis cucullatis, bracteis rhombeis acutis erectis.

bisalloſum. S. galea bicalloſa, foliis ovatis nervoſis, bracteis lanceolato-ſetaceis erectis.

bracteatum. S. galea bicalloſa, foliis ovatis trinerviis, bracteis reflexis.
Ophrys bracteata. Linn. Suppl. 403. Syst. 814.

LEMNA.

gibba. L. foliis ſeſſilibus ſubtus hemiſphæricis, radicibus ſolitariis.

SALIX.

ægyptiaca. S. foliis ſerratis lanceolato-ovatis venoſis glabris exſtipulatis.

mucronata. S. foliis integris glabris oblongis mucronatis ſubtus glaucis.

hirſuta. S. foliis integris utrinque hirſutis exſtipulatis ovatis mucronatis.

ANCISTRUM.

decumbens. A. foliis pinnatis hirſutis, fructibus tomentoſis glochidibus armatis.
Agrimonia decumbens. Linn. Suppl. 251. Syſtem. 448.

DIGYNIA.

GUNNERA.

arpenſa. G. Linn. Mant. 121. Syſt. 819.

CLAS-

CLASSIS III.

TRIANDRIA.

MONOGYNIA.

VALERIANA.

V. floribus triandris, foliis pinnatis: filiolis ovatis dentatis. *capenſis.*

WITSENIA.

W. Linn. Syſt. 83. *maura.*

ANTHOLYZA.

A. foliis baſi filiformibus apice linearibus nervoſis, ſpica oblonga diſticha. *lucidor.*

A. foliis enſiformibus utrinque attenuatis nervoſis, ſpica oblonga diſticha. *æthiopica.*

A. foliis enſiformibus glabris quadrinervoſis, ſpica oblonga diſticha. *nervoſa.*

A. foliis enſiformibus glabris ſtriatis, ſpica oblonga diſticha. *cunonia.*

A. foliis enſiformibus plicatis, ſpica ſecunda, ſpathis lanceolatis glabris. *ringens.*

A. foliis enſiformibus plicatis, ſpicis ſecundis, ſpathis ovatis villoſis. *plicata.*

GLADIOLUS.

G. monoſtachyus corollis cernuis cylindricis, tubo duplici, limbi laciniis ovatis, foliis enſiformibus glabris. *merianus.*

Antholyza meriana. Linn. Syſt. 87. Sp. 54.

G. monoſtachyus corollis cernuis, tubo duplici, limbi laciniis ovatis, foliis enſiformibus piloſis. *merianellus.*

Antholyza merianella. Linn. Syſt. 87.

watſonius. G. monoſtachyus corollis cernuis, tubo duplici, limbi laciniis oblongis, foliis linearibus glabris.

communis. G. monoſtachyus corollis cernuis, tubo duplici, foliis enſiformibus multinerviis.

triſtis. G. monoſtachyus corollis cernuis, tubo ſimplici, foliis trinerviis biſulcis linearibus.

montanus. G. monoſtachyus corollæ ringentis tubo ſpathæ obtuſæ æquali, foliis ellipticis nervoſis.

flexuoſus. G. monoſtachyus corollæ ringentis tubo ſpatha acuta longiore, ſcapo flexuoſo.

recurvus. G. monoſtachyus corollæ limbo reflexo, ſpica ſecunda, foliis linearibus.

falcatus. G. monoſtachyus corollæ limbo patenti, folio lanceolato falcato.

criſpus. G. monoſtachyus corollæ erectæ limbo campanulato, floribus ſecundis. foliis criſpis.

ſpicatus. G. monoſtachyus corollis erectis, ſpica imbricata diſticha, foliis linearibus.
Gladiolus ſpicatus. Linn. Spec. 53. Syſt. 86.
Ixia alopecuroidea. Linn. Supplem. 92.

alopecuroides. G. polyſtachyus ſpica imbricata diſticha, foliis enſiformibus nervoſis.

alatus. G. polyſtachyus corollæ laciniis lateralibus latiſſimis, foliis enſiformibus glabris.

bicolor. G. polyſtachyus corolla ringente, ſpathis lacero-ariſtatis, foliis enſiformibus glabris.

anceps. G. polyſtachyus ſcapo ancipiti, ſpathis criſpis.

junceus. G. polyſtachyus floribus ſecundis, foliis lanceolatis.

ſetifolius. G. polyſtachyus foliis lineari-ſetaceis.

marginatus. G. polyſtachyus ſpica longiſſima, floribus alternis cernuis, foliis enſiformibus multinerviis marginatis.

auguſtus. G. polyſtachyus floribus ſecundis, ſpathis acutis, foliis enſiformibus.

longiflorus. G. polyſtachyus tubo corollæ longiſſimo, ſpathis obtuſis ſoliisque enſiformibus glabris.
Gladiolus longiflorus. Linn. Suppl. 96. Syſt. 87.
Ixia longiflora. Berg. Plant. Cap. 7.

G. po-

G. polyſtachyus tubo corollæ longiſſimo, ſpathis foliisque ellipticis plicatis hirſutis. *subbiflorus.*
G. polyſtachyus floribus ſecundis, ſpathis foliisque enſiformibus plicatis hirſutis. *plicatus.*
G. polyſtachyus ſpathis membranaceis ariſtatis glabris, foliis enſiformibus plicatis hirſutis. *ſpathaceus.*
G. polyſtachyus ſcapo laxo, ſpicis capillaribus flexuoſis, foliis enſiformibus glabris. *graminеus.*

IXIA.

I. caule ramoſo foliis imbricatis tecto. *fruticoſa.*
I. ſcapis unifloris brevioribus, foliis lævibus. *minuta.*
I. ſcapo ramoſo, floribus ſolitariis, foliis ſulcatis reflexis longioribus. *bulbocodium.*
I. ſcapo ramoſo, floribus ſecundis, foliis ſulcatis erectis longioribus. *humilis.*
I. foliis linearibus piloſis brevioribus, floribus alternis. *piloſa.*
I. foliis enſiformibus hirtis brevioribus, floribus ſecundis. *hirta.*
I. foliis elliptico-enſiformibus brevioribus, ſcapo villoſo ſcabro. *ſecunda.*
I. foliis linearibus criſpis brevioribus, floribus alternis. *criſpa.*
I. foliis lanceolatis criſpis brevioribus, floribus alternis. *cinnamomea.*
I. foliis lanceolatis criſpis brevioribus, ſcapo ancipiti. *corymboſa.*
I. foliis linearibus brevioribus, ſcapo ſimplici erecto. *linearis.*
I. foliis linearibus brevioribus, ſcapo polyſtachyo, ſpathis ſcarioſis. *capillaris.*
I. foliis linearibus brevioribus, ſcapo flexuoſo glabro. *ſetacea.*
I. foliis linearibus brevioribus, floribus ſecundis, rachide flexuoſa. *ſcillaris.*
I. foliis linearibus brevioribus, ſpathis ariſtato-dentatis. *ariſtata.*
I. foliis lineari-enſiformibus brevioribus, ſcapo polyſtachyo, ſpicis pendulis. *pendula.*

bulbifera. I. foliis enſiformibus brevioribus, ſpathis membranaceis ſetaceo-laceris.

erecta. I. foliis enſiformibus brevioribus, ſcapo polyſtachyo, floribus alternis immaculatis.

maculata. I. foliis enſiformibus brevioribus, ſcapo polyſtachyo, floribus alternis, corollis baſi maculatis.

crocata. I. foliis enſiformibus brevioribus, floribus ſecundis, corollis baſi hyalino-feneſtratis.

lancea. I. foliis enſiformibus brevioribus, floribus ſecundis, ſcapo ſimplici flexuoſo.

pentandra. I. foliis enſiformibus brevioribus, floribus pentandris.

falcata. I. foliis enſiformibus reflexo-falcatis brevioribus.

exciſa. I. foliis ovatis brevioribus, floribus ſecundis, ſcapo flexuoſo.

GALAXIA.

ovata. G. foliis ovatis.

graminea. G. foliis lineari-filiformibus.
Galaxia graminea. Linn. Syſt. 609.
Ixia fugaciſſima. Linn. Supplem. 94.

DILATRIS.

corymboſa. D. petalis ovatis, panicula hirſuta.
Dilatis corymboſa. Berg. Plant. Cap. 9. tab. 3.
Ixia hirſuta. Linn. Mant. 27. 320. 54.
Wachendorfia umbellata. Linn. Syſt. 93. Supplem. 101.

viſcoſa. D. petalis linearibus, panicula villoſo-viſcida.

paniculata. D. petalis lanceolatis, caule paniculato.

MORÆA.

melaleuca. M. ſcapo ancipiti, foliis linearibus ſubfalcatis, flore ſubſolitario.
Moræa lugens. Linn. Syſt. 93.

ſpiralis. M. ſcapo ancipiti articulato, foliis erectis, floribus alternis ſubſecundis.

africana. M. ſcapo ancipiti, foliis diſtichis, floribus capitatis, ſpathis membranaceo-laceris.

M. ſca-

M. ſcapo ancipiti, foliis diſtichis, flore ſubſo- *puſilla.*
litario.
M. ſcapo ancipiti, foliis diſtichis, floribus capi- *bermudiana.*
tato-umbellatis, ſpathis membranaceis.
M. ſcapo foliisque compreſſis, ſpica laterali ſo- *gladiata.*
litaria involucro duplo breviore.
M. ſcapo foliisque compreſſis, ſpica laterali ſo- *aphylla.*
litaria involucro multoties breviore.
M. ſcapo foliisque compreſſis ſubliliformibus, *filiformis.*
flore ſolitario terminali.
M. ſcapo foliisque terectibus dependentibus, ſpi- *ſpathacea.*
cis lateralibus aggregatis.
M. ſcapo tereti articulato, folio reflexo ſubun- *flexuoſa.*
dulato nervoſo.
M. ſcapo tereti, folio dependente, laciniis co- *collina.*
rollæ ſubæqualibus.
M. ſcapo tereti, foliis flexuoſo-erectis, laciniis *polyanthos.*
corollæ alternis minoribus.
M. ſcapo tereti, foliis diſtichis, florum capitulis *cærulea.*
alternis, ſpathis membranaceis integris.
M. ſcapo tereti ſtriato, florum ſpicis umbellato- *umbellata.*
paniculatis, involucris diphyllis longiſſimis.
M. ſcapo tereti articulato, folio convoluto cri- *criſpa.*
ſpo reflexo.
M. ſcapo ramoſiſſimo, foliis vaginantibus carno- *undulata.*
ſis, corolla criſpa.
Ferraria undulata. Linn. Spec. 1353. Syſt. 820.

IRIS.

I. barbata foliis enſiformibus ciliatis. *ciliata.*
I. barbata foliis enſiformibus glabris, ſcapo uni- *minuta.*
floro, petalis oblongis acutis.
I. barbata foliis enſiformibus glabris, ſcapo pa- *compreſſa.*
niculato compreſſo.
I. barbata folio lineari longiori, ſcapo unifloro, *tripetala.*
petalis alternis ſubulatis.
I. barbata folio lineari longiori, ſcapo ſubbi- *tricuſpis.*
floro, petalis alternis trifidis.
I. barbata foliis linearibus, ſcapo multifloro, ſti- *plumaria.*
gmatibus ſetaceo-multifidis.

I. im-

ſpatharea. I. imberbis foliis enſiformibus rigidis, ſcapo tereti bifloro, ſpathis longiſſimis.

ramoſa. I. imberbis foliis enſiformibus, ſcapo paniculato multifloro.

anguſta. I. imberbis folio filiformi-lineari erecto glabro, ſcapo glabro ſubunifloro, ſpathis obtuſis.

ſetacea. I. imberbis folio filiformi-lineari erecto glabro, ſcapo glabro unifloro, ſpathis acutis membranaceis.

pavonia. I. imberbis folio lineari glabro, ſcapo ſubuniflo ro.

criſpa. I. imberbis foliis linearibus criſpis.

papilionacea. I. imberbis foliis linearibus reflexis hirtis.

edulis. I. imberbis folio lineari pendulo glabro, ſcapo glabro multifloro.

triſtis. I. imberbis foliis linearibus glabris, ſcapo hirto ramoſo.

polyſtachya. I. imberbis foliis linearibus planis, ſcapo glabro ramoſo.

viſcaria. I. imberbis foliis linearibus planis, ſcapo viſcoſo.

bituminoſa. I. imberbis foliis linearibus ſpiralibus, ſcapo viſcoſo.

WACHENDORFIA.

thyrſiflora. W. ſcapo ſubſimplici, panicula coarctata, foliis enſiformibus quinquenerviis plicatis glabris.

paniculata. W. ſcapo polyſtachyo, panicula patenti, foliis enſiformibus trinerviis plicatis piloſis.

hirſuta. W. ſcapo polyſtachyo, panicula patenti, foliis enſiformibus trinerviis plicatis villoſis.

tenella. W. ſcapo ſubpolyſtachyo, panicula patenti, foliis linearibus trinerviis glabris.

graminea. W. ſcapo polyſtachyo, panicula patenti, foliis enſiformibus canaiiculatis glabris.

XYRIS.

capenſis. X. capitulo ovato, foliis linearibus breviſſimis.

FICUS.

cordata. F. foliis ſubcordatis ovatis acutis glabris coriaceis, caule fruticoſo erecto.

F. fo-

F. foliis ovatis acutis glabris ferratis, fructibus pedunculatis glabris. *capenſis.*

RUSCUS.

R. volubilis foliis ovato-oblongis multinerviis. *volubilis.*
R. ſcandens foliis ovatis multinerviis reticulatis, floribus pedunculatis ſolitariis. *reticulatus.*

BRYONIA.

B. foliis cordatis angulatis dentatis ſupra calloſo-punctatis ſubtus piloſo-ſcabris, floribus umbellatis. *ſcabra.*
B. foliis cordatis angulatis dentatis ſupra calloſis ſubtus piloſis, pedunculis unifloris. *punctata.*
B. foliis trilobis ſupra lævibus ſubtus ſcabris. *tribola.*
B. foliis 5-angulatis utrinque ſcabris, floribus ſubumbellatis. *angulata.*
B. foliis angulatis trilobis quinquelobisque glabris margine ſcabris. *africana.*
B. foliis cordatis palmatis ſerratis lævibus, floribus axillaribus ſubumbellatis. *lævis.*
B. foliis angulatis integris lævibus glabris. *acutangula.*
B. foliis 5-lobis denticulatis ſupra ſcabris, pedunculis unifloris. *quinqueloba.*
B. foliis digitatis: laciniis lincaribus bilobis ſcabris, floribus umbellatis. *digitata.*
B. foliis digitatis ſubtus ſcabris: laciniis pinnatifidis, floribus umbellatis. *diſſecta.*

CUCUMIS.

C. foliis ſinuato-lobatis, caule angulato, fructu ovali echinato. *africanus.*
C. foliis cordatis 5-lobis denticulatis obtuſis, fructibus globoſis ſpinoſo-muricatis. *prophetarum.*
C. foliis multifidis, fructibus globoſis glabris. *colocynthis.*

MOMORDICA.

M. foliis ternato-pinnatifidis ſcabris, fructu lanato. *lanata.*

TRA-

TRAGIA.

villosa. T. foliis cordatis crenatis subtus hirsutis, caule scandente.

capensis. T. foliis cordato-ovatis dentatis hispidis, caule volubili, involucro pectinato.

ACHARIA.

tragodes. A. c. fig.

TYPHA.

latifolia. T. foliis ensiformibus, spica mascula femineaque approximatis.

CAREX.

capensis. C. spica composita spiculis androgynis: inferioribus bractea longiori instructis, culmo compresso.

glomerata. C. spica composita spiculis androgynis, bractea longiori horizontali distinctis, culmo trigono.

clavata. C. spicis simplicibus obovatis androgynis: inferioribus folio longiori instructis, culmo trigono.

vesicaria. C. spicis masculis pluribus, femineis pedunculatis, capsulis inflatis acuminatis glabris.

ELEGIA.

juncea. E. Linn. Mantiss. 162. 292. Syst. 882.

WILDENOWIA.

striata. W. culmo tereti striato.

teres. W. culmo ramisque teretibus lævibus.

compressa. W. culmo foliose lævi, ramis compressis.

RESTIO.

imbricatus. R. culmo simplici aphyllo, spica oblonga compressa.

R. cul-

R. culmo ſimplici aphyllo, ſpicis alternis erectis, ſquamis acuminatis. *vaginatus.*
R. culmo ſimplici aphyllo, ſpicis terminalibus obovatis erectis, ſquamis ariſtatis. *ariſtatus.*
R. culmo ſimplici aphyllo, ſpicis turbinatis pendulis, ſquamis obtuſis cum acumine. *cernuus.*
R. culmo ſimplici aphyllo, ſpicis umbellatis ovatis, ſquamis oblongis obtuſis. *umbellatus.*
R. culmo ſimplici aphyllo, ſpicis oblongis hexagonis, ſquamis lanceolatis apice patulis. *ſpicigerus.*
R. culmo ſimplici aphyllo, panicula ſimplici erecta, ſquamis ariſtatis. *acuminatus.*
R. culmo ſimplici aphyllo, ſpicis racemoſis ſubſecundis, glumis fuſcis nitidis. *teſtorum.*
R. culmo ſimplici aphyllo, panicula erecta, ſquamis rotundatis membranaceis. *parviflorus.*
R. culmo ſimplici aphyllo, panicula erecta involucrata, ſpathis imbricatis lanceolatis. *erectus.*
R. culmo ſimplici anhyllo, panicula erecta, ſquamis lanceolatis ſcarioſis. *argenteus.*
R. culmo ſimplici folioſo, ſquamis ſpicarum lanceolatis ſcarioſis. *ſcarioſus.*
Thamnochortus fruticoſus. Berg. Capenſ. 353. t. 5. f. 8.
R. culmo ſimplici folioſo, panicula patenti, ſquamis lanceolatis margine ſcarioſis. *thamnochortus*
R. culmo ſimplici folioſo, panicula compoſita, ſquamis ſcarioſis laceris. *fruticoſus.*
R. culmo ſimplici folioſo, ſpicis alternis ſeſſilibus. *triflorus.*
R. culmo ramisque tetragonis, ſpicis alternis. *tetragonus.*
R. culmo dichotomo aphyllo erecto, ramis teretibus, ſpicis alternis. *triticeus.*
R. culmo dichotomo aphyllo lævi, panicula glomerata. *glomeratus.*
R. culmo dichotomo aphyllo ſtriato, ſpicis imbricato-aggregatis. *incurvatus.*
R. culmo dichotomo aphyllo, ramis teretibus, ſpicis ternis oblongis. *digitatus.*
R. ramis verticillatis, panicula compoſita. *verticillaris.*
R. culmo dichotomo folioſo, ramis compreſſis, panicula ſpicis conglomeratis. *ſcopa.*

virgatus. R. culmo dichotomo folioſo, ramis compreſſis, ſpicis paniculatis pendulis.

paniculatus. R. culmo dichotomo folioſo, ramis compreſſis, ſpicis ſeſſilibus alternis erectis.

dichotomus. R. culmo dichotomo folioſo decumbente, ramis teretibus, ſpicis ſolitariis alternisque.
Schœnus capenſis. Linn. Spec. 64.
Reſtio dichotomus. Linn. Syſt. 881.

SCHOENUS.

filiformis. S. culmo tereti capillari, capitulo oblongo, involucro triphyllo.

ſtriatus. S. culmo tereti, capitulo ovato, involucro triphyllo.

capitellum. S. culmo tereti, capitulo ovato, involucro diphyllo.

ſcarioſus. S. culmo tereti, capitulo oblongo, involucro monophyllo, glumis margine ſcarioſis.

nigricans. S. culmo tereti, capitulo ovato, involucro monophyllo.

triſtachyus. S. culmo tereti articulato lævi, capitulis tribus terminalibus.

cuſpidatus. S. culmo tereti, ſpicis paniculatis involucris brevioribus.

ariſtatus. S. culmo tereti aphyllo, ſpicis aggregatis, involucro monophyllo, glumis cuſpidatis.

compar. S. culmo tereti aphyllo, ſpicis aggregatis, involucris monophyllis brevioribus, glumis acutis.

flexuoſus. S. culmo tereti folioſo, ſpicis paniculatis, glumis mucronatis.

capillaceus. S. culmo tereti folioſo, ſpicis ſubraremoſis, glumis cuſpidatis, foliis capillaribus.

uſtulatus. S. culmo tereti folioſo, ſpicis racemoſis, glumis ariſtatis.

ſpicatus. S. culmo tereti capillari, capitulis ſpicatis involucratis.

bulboſus. S. culmo tereti filiformi, ſpicis racemoſis ſecundis, involucris ſolitariis.

inanis. S. culmo tereti aphyllo, ſpicis paniculatis, glumis acutis.

S. cul-

S. culmo trigono folioso, capitulis paniculatis, glumis ciliatis. *glomeratus.*
S. culmo trigono folioso, capitulis lateralibus, glumis integris aristatis. *thermalis.*
S. culmo trigono folioso, capitulis lateralibus, glumis mucronatis, spicis ovatis. *lævis.*
S. culmo trigono folioso, spicis paniculatis lateralibus, glumis spiculisque lanceolatis. *lanceus.*

SCIRPUS.

S. culmo capillari, capitulo ovato solitario, involucro monophyllo. *setaceus.*
S. culmo compresso folioso flexuoso-erecto, spicis duabus lateralibus. *natans.*
S. culmo capillari, capitulo subdistachyo, glumis acuminatis squarrosis, involucro monophyllo. *hystrix.*
S. culmo capillari, capitulo tristachyo, glumis integris glabris, involucro monophyllo. *marginatus.*
S. culmo angulato aphyllo, spicis tribus terminalibus. *trispicatus.*
S. culmo capillari, capitulo fasciculato rotundato, glumis glabris, involucro monophyllo. *antarcticus.*
S. culmo filiformi, capitulis lateralibus alternis involucro brevioribus. *vaginatus.*
S. culmo tereti, spicis subumbellatis oblongis, involucro monophyllo, glumis acutis. *lacustris.*
S. culmo tereti, capitulo glomerato globoso, involucro diphyllo, foliis linearibus. *truncatus.*
S. culmo tereti, capitulo triangulari, glumis ovatis ciliatis, involucro diphyllo. *laciniatus.*
S. culmo capillari, capitulo tristachyo, glumis integris, involucro diphyllo. *tristachyos.*
S. culmo tereti, capitulis globosis pedunculatis sessilibusque, glumis acutis, involucro diphyllo. *holoschœnus.*
S. culmo trigono, spicis subumbellatis, glumis lacero-trifidis, involucro diphyllo. *maritimus.*
S. culmo tereti, capitulo angulato, glumis ovatis membranaceis, involucro triphyllo. *membranaceus*

hottentottus. S. culmo trigono folioſo, capitulo globoſo, glumis hirtis, involucro triphyllo.

intricatus. S. culmo trigono, umbella ſimplici, ſpicis oblongis ſquarroſis, involucro triphyllo.

piloſus. S. culmo compreſſo, capitulo ovato, glumis lanceolatis ciliatis, involucro tetraphyllo.

radiatus. S. culmo tereti, capitulo hemiſphærico, involucro polyphyllo.

faſtigiatus. S. culmo filiformi, capitulo convexo compreſſo, glumis extimis mucronatis, involucro nullo.

CYPERUS.

prolifer. C. culmo tereti, capitulo globoſo prolifero.

minimus. C. culmo capillari, ſpica ſolitaria geminaque, involucro monophyllo.

marginatus. C. culmo tereti aphyllo, umbella compoſita, ſpiculis oblongis brunneis.

textilis. C. culmo tereti, umbella decompoſita involucro dodecaphyllo lævi breviore, ſpiculis oblongis.

pulcher. C. culmo trigono, umbella decompoſita involucro ſubhexaphyllo breviore, ſpiculis ovatis.

ligularis. C. culmo trigono, umbella compoſita involucro polyphyllo ſerrato breviore, ſpiculis cylindricis.

alopecuroides. C. culmo trigono, umbella decompoſita involucro polyphyllo ſerrato breviore, ſpiculis cylindricis.

corymboſus. C. culmo trigono aphyllo, umbella decompoſita involucro breviore, ſpicis linearibus.

lanceus. C. culmo trigono folioſo, umbella compoſita, involucro duplo breviore, ſpiculis oblongis.

polyſtachyos. C. culmo trigono, umbella compoſita convexa, involucris quinis, ſpiculis lanceolatis.

lævigatus. C. culmo trigono, capitulo glomerato globoſo, involucro diphyllo, glumis obtuſis.

DIGYNIA.

PANICUM.

gallı. P. ſpicis alternis, floribus ſecundis: glumis hiſpidis ariſtatis, rachi pentagona.

P. ra-

P. racemis ſpicatis digitatis linearibus, floribus binis, altero ſubſeſſili. *filiforme.*
P. ſpicis digitatis ſubquaternis ſecundis, culmo ſarmentoſo. *dactylon.*
P. panicula patenti, floribus ſolitariis, glumis glabris apice purpureis. *denſum.*
P. panicula ſubſpicata coarctata, floribus ſolitariis, glumis glabris acutis. *caudatum.*

ARISTIDA.

A. panicula trichotoma patenti, ariſtis æqualibus glabris, calyce æquali. *hyſtrix.*
A. panicula trichotoma patenti, ariſtis æqualibus glabris, calyce inæquali. *veſtita.*
A. panicula trichotoma patenti, ariſtis omnibus villoſis. *capenſis.*

ALOPECURUS.

A. ſpica cylindrica, glumis glabris muticis. *capenſis.*
A. panicula ſuſpicata ovata, calycibus hirtis, corollis ariſtatis. *monſpelienſis.*
A. panicula ſpicata ovata, glumis punctatis ciliatis, culmo geniculato. *echinatus.*

PHALARIS.

P. panicula ſpicata ovata, glumis integris, culmo geniculato-decumbente. *capenſis.*
P. panicula ſpicata cylindrico-oblonga, glumis integris, culmo erecto. *aquatica.*
P. ſpica ſubpaniculata cylindrica, glumis ſerratis, culmo geniculato. *dentata.*

AGROSTIS.

A. panicula ſpicata cylindrica mutica, culmo nutante. *ſpicata.*
A. panicula patenti, corolla mutica, calycibus æqualibus, culmo repente. *ſtoloniſera.*

STIPA.

S. ariſtis baſi piloſis, panicula ſpicata, foliis enſiformibus. *capenſis.*

arguens. S. ariſtis baſi piloſis, paniculâ faſtigiata, bracteis baſi barbatis.

ſpicata. S. ariſtis baſi piloſis, racemo ſpicato ſecundo.

ANDROPOGON.

hirtum. A. paniculæ ſpicis conjugatis, calycibus hirſutis.

iſchæmum. A. paniculæ ſpicis digitatis muticis, flore ſeſſili ariſtato, pedunculis piloſis.

villoſum. A. ſpicis digitatis, floribus ariſtatis ſeſſili pedunculatoque, calyce culmoque villoſo.

ſchœnanthus. A. paniculæ ſpicis conjugatis oblongis, rachide pubeſcente, floſculis ſeſſilibus ariſtatis.

inſulare. A. panicula laxa, floribus geminis muticis, calycibus lanatis.

CHLORIS.

petræa. C. ſpicis digitatis ſenis ſecundis, corolla margine membranacea ciliata.

HOLCUS.

caffrorum. H. glumis villoſis, ſeminibus compreſſis inermibus.

capillaris. H. glumis biflоris nudiuſculis, floſculo hermaphrodito mutico, maſculo ariſtato, pedunculis glabris.

avenaceus. H. glumis glabris, ſeminibus hirſutis ariſtatis, panicula ſpirata.

ſerratus. H. glumis pubeſcentibus, ſpicis alternis, foliis ſerratis.

aſper. H. glumis glabris, panicula coarctata, foliis ſerratis.

SACCHARUM.

ſpicatum. S. panicula ſpicata, foliis lævibus.

AIRA.

aquatica. A. panicula patente, floribus muticis lævibus calyce longioribus, foliis planis.

ME-

MELICA.

M. corollis glabris muticis, panicula coarctata, culmo ramoso. *ramosa.*
M. corollis glabris muticis, panicula patentissima, foliis subfiliformibus. *capensis.*
M. coroliis hirsutis aristatis, panicula verticillata, culmo erecto. *gigantea.*
M. corollis hirtis, panicula coarctata, culmo decumbente. *geniculata.*
M. corollis hirsutis, floribus racemosis nutantibus, culmo decumbente. *decumbens.*
M. corollis hirtis, racemis cernuis, culmo erecto. *racemosa.*

ISCHÆMUM.

I. seminibus aristatis. *aristatum.*

APLUDA.

A. foliis lanceolatis, floribus masculis muticis, sessili aristato. *aristata.*

BRIZA.

B. spiculis ovatis septemfloris, calyce floribus æquali. *virens.*
B. spiculis ovatis septemfloris, calyce floribus breviore. *media.*
B. spiculis ovatis duodecimfloris, calyce floribus breviore. *maxima.*
B. spiculis ovatis, calyce floribus breviore, culmo geniculato. *geniculata.*
B. spiculis ovatis decemfloris, panicula coarctata. *capensis.*

POA.

P. panicula patenti, culmo olique compresso. *annua.*
P. panicula coarctata, spiculis lanceolatis decemfloris, culmo sarmentoso. *sarmentosa.*
P. panicula patenti, spiculis acutis quadrifloris, foliis filiformibus. *filiformis.*
P. panicula coarctata, spiculis ovatis novemfloris, pedunculis brevissimis. *racemosa.*

cyperoides. P. paniculis ſpicato-glomeratis, ſpiculis 11-floris, culmo ramoſo, foliis ſubulatis.
glomerata. P. paniculâ ſpicata glomerata, ſpiculis 4-floris, corollis ciliatis.
ſtriata. P. paniculâ patenti, ſpiculis ovatis ſubdecemfloris, culmo repente.
ſpinoſa. P. ſpicis pedunculatis ſparſis, ramis ſpineſcentibus, culmo ramoſo.

FESTUCA.

bromoides. F. paniculâ ſecundâ, ſpiculis erectis, calycis valvulâ altera acuminata.

DACTYLIS.

lævis. D. paniculâ coarctatâ, glumis lævibus.
villoſa. D. paniculâ ſpicatâ, glumis villoſis.
ferrata. D. paniculâ coarctatâ, glumis carinâ ferrulatis.
ciliaris. D. paniculâ ſpicatâ involucratâ ovatâ, glumis ciliatis.
hiſpida. D. paniculâ ſpicatâ ovatâ nudâ, calyce hiſpido, geniculis barbatis.

BROMUS.

mollis. B. paniculâ erecto-patenti, ſpicis ovatis foliisque villoſis, ariſtis erectis.
pectinatus. B. paniculâ patenti, ſpicis ovatis glabris, corollæ valvulâ interiori ciliatâ mutica.

AVENA.

ariſtidoides. A. paniculâ trichotomâ, calycibus biſloris, corollis biſidis ariſtatis.
triſeta. A. paniculâ trichotomâ, calycibus biſloris, corollis triariſtatis: ariſtis lateralibus baſi villoſis brevioribus.
pallida. A. paniculâ trichotomâ, calycibus biſloris, corollis triariſtatis: ariſtis nudis, intermediâ longiori.
hiſpida. A. racemoſa calycibus triſloris piloſis.
antarctica. A. paniculâ coarctatâ, calycibus 4-floris, corollis biſidis ariſtatis.

A. pa-

A. panicula compoſita, calycibus 4-floris, co- *elephantina.*
rollis piloſis biſidis ariſtatis.
A. panicula coarctata, calycibus 4-floris, corol- *lupulina.*
lis villoſis ariſtatis, culmo erecto.
A. panicula coarctata, calycibus 4-floris, corol- *purpurea.*
lis villoſis ariſtatis, culmo decumbente.
A. paniculata calycibus 5-floris: exterioribus *ſterilis.*
floſculis ariſtatis baſique piloſis, interiori-
bus muticis.

ARUNDO.

A. calycibus 5-floris, panicula laxa. *phragmites.*

ROTTBOELLIA.

R. ſpica dimidiata compreſſa lineari. *dimidiata.*

SECALE.

S. glumis lanceolatis ciliatis ſubſcabris. *cereale.*

TRITICUM.

T. calycibus 4-floris glabris muticis, floribus *diſtichum.*
diſtichis, foliis filiformibus.
T. calycibus 4-floris ſubulatis acuminatis, fo- *repens.*
liis planis.

HORDEUM.

H. floſculis lateralibus maſculis, involucris ſcabris. *capenſe.*

LOLIUM.

L. ſpica ariſtata, ſpiculis compreſſis multifloris. *temulentum.*

CYNOSURUS.

C. ſpica ſecunda falcata, calyce lanceolato-in- *falcatus.*
tegro, corolla ciliata.
Melica falx. Linn. Syſt. 113. Suppl. 109.
C. ſpica ſolitaria diſticho-ſecunda, calyce mul- *uniolæ.*
tifloro mucronato, corollis baſi villoſis.
C. ſpica compoſita ovata, calyce multifloro: glu- *paniculatus.*
ma altera mucronata, corollis baſi piloſis.

CENCHRUS.

alopecuroides. C. ſpica cylindrica, florum involucro polyphyllo villoſo.

geniculatus. C. racemo ſpicato ſimplici, florum involucro polyphyllo ſcabro, culmo geniculato.

hordeiformis. C. racemo ſpicato ſimplici, florum involucro polyphyllo ſcabro, culmo erecto.

TRIGYNIA.

HOLOSTEUM.

tetraphyllum. H. caule ramoſo decumbente, foliis quaternis. *Polycarpon tetraphyllum.* Linn. Suppl. 131. Syſtem. 129.

MOLLUGO.

hirta. M. decumbens villoſa, foliis ovatis.

PHYLLANTHUS.

incurvus. P. foliis oblongis, caulibus filiformibus, floribus pedunculatis.

verrucoſus. P. caule arboreo verrucoſo, foliis cuneiformibus, ramis incurvis.

CLASSIS IV.

TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

PROTEA.

P. foliis trifidis filiformibus, caule decumbente. *decumbens.*

P. foliis trifidis filiformibus, caule erecto, capitulis solitariis bracteis obvallatis. *florida.*

P. foliis trifido-pinnatis filiformibus, caule erecto, capitulis solitariis nudis. *cyanoides.*

P. foliis trifido-pinnatis filiformibus, caule erecto, capitulis aggregatis. *patula.*

P. foliis bipinnatis filiformibus, pedunculis capitulis brevioribus, squamis calycinis ovatis basi villosis. *sphærocephala*

P. foliis bipinnatis filiformibus hirtis, pedunculis capitulis longioribus, squamis calycinis ovato-lanceolatis hirtis. *serraria.*

P. foliis bipinnatis filiformibus glabris, pedunculis capitulis longioribus, squamis calycinis lanceolatis hirtis. *triternata.*

P. foliis bipinnatis filiformibus, pedunculo communi elongato nudo, pedicellis capitulis longioribus. *glomerata.*

P. foliis bipinnatis filiformibus, capitulis terminalibus solitariis lanatis. *phylicoides.*

P. foliis bipinnatis filiformibus, capitulis spicatis aggregatis. *lagopus.*

P. foliis bipinnatis filiformibus, capitulis spicatis distinctis. *spicata.*

P. foliis inferioribus bipinnatis, superioribus trifidis integrisque. *sceptrum.*

P. foliis 5-dentatis glabris, caule erecto, capitulis subternis terminalibus. *crinita.*

P. foliis 5-dentatis glabris, caule erecto, capitulo terminali. *conocarpa.*

elliptica. P. foliis ellipticis tridentatis glabris, caule erecto, capitulo terminali.

hypophylla. P. foliis tridentatis glabris fecundis, caule decumbente, capitulo terminali.

cucullata. P. foliis tridentatis glabris, capitulis lateralibus.

tomentosa. P. foliis tridentatis tomentosis.

heterophylla. P. foliis tridentatis integrisque, caule decumbente.

pinifolia. P. foliis filiformibus, floribus racemosis ecalyculatis glabris.

racemosa. P. foliis filiformibus, floribus racemosis calyculatis tomentosis.

incurva. P. foliis filiformibus incurvis glabris, capitulis racemoso-spicatis tomentosis.

caudata. P. foliis filiformibus hirtis, capitulis subsessilibus spicatis.

bracteata. P. foliis filiformi-canaliculatis, capitulo terminali, bracteis multifidis.

comosa. P. foliis inferioribus filiformibus, superioribus lanceolatis, capitulo terminali.

purpurea. P. foliis linearibus recurvis, capitulis terminalibus cernuis, caule decumbente.

prolifera. P. foliis subulatis adpressis, caule prolifero.

corymbosa. P. foliis linear-subulatis adpressis, ramulis verticillatis subfastigiatis.

nana. P. foliis linear-subulatis, capitulo terminali, calyce colorato.

lanata. P. foliis trigonis adpressis, capitulo terminali lanato.

torta. P. foliis linearibus obliquis callosis.

alba. P. foliis linearibus fericeo-tomentosis.

aulacea. P. foliis ellipticis, floribus racemosis ecalyculatis.

umbellata. P. foliis ellipticis, capitulis terminalibus, bracteis multifidis.

linearis. P. foliis ellipticis, capitulo terminali tomentoso.

scolymus. P. foliis lanceolatis acutis capituloque terminali rotundo glabris.

mellifera. P. foliis lanceolato-ellipticis capituloque terminali oblongo glabris, caule erecto.

repens. P. foliis lanceolato-ellipticis capituloque ovato glabris, caule decumbente.

P. so-

P. foliis ellipticis callosis capitulisque villosis, caule decumbente. *prostrata.*
P. foliis ellipticis glabris callosis obliquis, capitulo cauline terminali. *obliqua.*
P. foliis ellipticis obtusis callosis obliquis, capitulis terminalibus ramulorum glabris. *parviflora.*
P. foliis ellipticis glabris acutis callosis. capitulo terminali involucrato, involucro longo acuto pallido. *pallens.*
P. foliis ellipticis glabris acutis callosis, capitulo terminali involucrato, involucro longo acuto concolore. *conifera.*
P. foliis ellipticis glabris obtusis, capitulo terminali involucrato, involucro brevi obtuso. *leviſanus.*
P. foliis ellipticis oblongis retuso-callosis capituloque terminali glabris. *ſtrobilina.*
P. foliis lanceolatis glabris striatis imbricatis, capitulo terminali. *imbricata.*
P. foliis lanceolatis sericeis, ramis filiformibus, caule decumbente. *sericea.*
P. foliis lanceolatis sericeis, caule fruticoso, capitulis oblongis involucratis. *saligna.*
P. foliis lanceolatis argenteo-tomentosis ciliatis, caule arboreo, capitulis globosis. *argentea.*
P. foliis oblongis capituloque globoso glabris, caule decumbente brevissimo. *acaulis.*
P. foliis oblongis glabris, capitulis terminalibus aggregatis. *myrtifolia.*
P. foliis oblongis nervosis capituloque hemisphærico glabris, caule arboreo. *grandiflora.*
P. foliis oblongis aveniis capituloque hemisphærico glabris, caule fruticoso. *glabra.*
P. foliis oblongis glabris, capitulo oblongo, squamis calycinis apice barbatis. *speciosa.*
P. foliis ovatis glabris callosis, capitulo ovato, corollis cylindricis hirtis. *totta.*
P. foliis ovatis glabris, floribus lateralibus. *hirta.*
P. foliis ovatis capitulisque terminalibus tomentosis. *pubera.*
P. foliis ovatis hirtis, capitulis terminalibus, ramis divaricatis. *divaricata.*

P. fo-

ſpathulata. P. foliis ſpathulatis ſubcucullatis glabris.
cynaroides. P. foliis ſubrotundis petiolatis glabris.
cordata. P. foliis cordatis.

FAGARA.

capenſis. F. foliis pinnatis: pinnis ovatis obtuſis crenatis, ramis aculeatis flexuoſis.
armata. F. foliis pinnatis: pinnis crenatis, ramis petiolisque aculeatis.

CURTISIA.

fagina. C.

SCHREBERA.

ſchinoides. S. Linn. Syſt. 265.
Hartogia capenſis. Linn. Syſt. 165.

SERPICULA.

repens. S. foliis alternis.

MONTINIA.

acris. M.

MONETIA.

barlerioides. M.

SCABIOSA.

rigida. S. corollis quadrifidis inæqualibus, calycis ſquamis obtuſis, foliis oblongis ſerratis ſcabris.
trifida. S. corollis quadrifidis æqualibus, calycis ſquamis obtuſis, foliis linearibus integris trifidisque.
humilis. S. corollis quadrifidis inæqualibus, calycis ſquamis obtuſis, foliis linearibus dentato-pinnatifidis.
decurrens. S. corollis quadrifidis inæqualibus, calycis ſquamis ovatis, foliis pinnatifidis: pinnis decurrentibus.

S. co-

S. corollis quadrifidis æqualibus, calycis squa- *ustulata.*
mis acutis, foliis lyratis dentatis.
S. corollis quadrifidis æqualibus, calycis squa- *scabra.*
mis obtusis, foliis bipinnatifidis scabris rigidis.
S. corollis quinquefidis radiantibus, calycis squa- *acaulis.*
mis lanceolatis brevioribus, foliis obovatis incisis.
S. corollis quinquefidis æqualibus, caule fruti- *africana.*
coso, foliis simplicibus incisis.
S. corollis quinquefidis radiantibus, calycis squa- *marittima.*
mis lanceolatis longioribus, foliis infimis
lyratis, summis pinnatifidis.
S. corollis quinquefidis radiantibus, foliis bi- *ochroleuca.*
pinnatis: pinnis linearibus.

STILBE.

S. foliis quaternis, spicis erectis. *ericoides.*
S. foliis quaternis, spicis cernuis. *cernua.*
S. foliis senis, spicis erectis. *pinastra.*

PAVETTA.

P. foliis obovatis, floribus subumbellatis, caly- *caffra.*
cibus setacco-aristatis.

OLDENLANDIA.

O. floribus verticillatis pedunculatis, foliis li- *capensis.*
nearibus.

SCOPARIA.

S. foliis lanceolatis alternis integris, panicula *arborea.*
trichotoma, caule arboreo.

PLANTAGO.

P. foliis ovatis glabris, caule tereti, spicæ flo- *major.*
ribus imbricatis.
P. foliis ellipticis, spicæ floribus distinctis. *capensis.*
P. foliis linearibus ciliatis, spica cylindrica, *hirsuta.*
caule hirsuto.

P. fo-

læflingii. P. foliis linearibus ſubdentatis, caule tereti, ſpica ovata, bracteis carinatis membranaceis.

BUDLEIA.

incomta. B. foliis faſciculatis ovatis canis, racemis terminalibus, ramis flexuoſis rigidis.

virgata. B. foliis lineari-oblongis obtuſis integris, racemis terminalibus, ramis virgatis erectis.

PENÆA.

myrtilloides. P. floribus terminalibus, foliis lanceolatis.

fruticuloſa. P. floribus terminalibus, foliis ovatis glabris, bracteis obovatis.

mucronata. P. floribus terminalibus, foliis acuminatis glabris.

ſquamoſa. P. floribus terminalibus, foliis rhombeo-cuneiformibus glabris.

fucata. P. floribus terminalibus, foliis rhombeo-ovatis, bracteis coloratis.

lateriflora. P. floribus lateralibus, foliis ovatis glabris.

tomentoſa. P. floribus lateralibus, foliis ovatis tomentoſis.

RUBIA.

cordifolia. R. foliis quaternis cordatis.

GALIUM.

capenſe. G. foliis ſenis linearibus glabris, caule frutescente erecto.

mucronatum. G. foliis ſenis linearibus mucronatis glabris, caule pubeſcente debili.

expanſum. G. foliis ſenis linearibus mucronatis glabris, ramis divaricatis pubeſcentibus, panicula trichotoma.

aſperum. G. foliis ſenis oblongis ſerratis, caule hiſpido piloſo, floribus paucis.

glabrum. G. foliis ſenis oblongis ſerratis, caule hiſpido glabro, floribus paniculatis.

maritimum. G. foliis quaternis hiſpidis, pedunculis unifloris, ramis tomentoſo-albis.

CA.

CAVANILLA.

C. — *jcandens.*

LAUROPHYLLUS.

L. *expensio.*

ALCHEMILLA.

A. foliis lobatis, racemis lateralibus. *capensis.*

VISCUM.

V. caule aphyllo subtetragono rugoso, floribus verticillutis sessilibus. *capense.*

V. foliis rotundatis, floribus subverticillatis pe. duncultis. *rotundifolium.*

V. foliis ovatis obtusis incanis, floribus sparsis solitariis. *pauciflorum.*

V. foliis ellipticis glabris, caule fruticoso. *obscurum.*

PARIETARIA.

P. foliis oppositis ovatis serratis, ramis diffusis, floribus sessilibus. *capensis.*

URTICA.

U. foliis oppositis ovatis inciso-serratis hispidis, caule erecto. *urens.*

U. foliis oppositis cordatis villosis hispidis, racemis geminis, caule erecto. *dioica.*

U. foliis alternis cordato-ovatis crenatis, floribus axillari-subspicatis, ramis diffusis. *capensis.*

U. foliis alternis cordato-ovatis serratis, floribus axillaribus sessilibus, caule debili erectiusculo. *caffra.*

BRABEIUM.

B. *stellatum.*

DI-

DIGYNIA.

CUSCUTA.

americana. C. floribus pedunculatis.

ANTHOSPERMUM.

galopina. A. foliis oppositis oblongis glabris.
Galopina circeoides. Linn. Syst. 166.
lanceolatum. A. foliis verticillatis lanceolatis glabris.
æthiopicum. A. foliis subverticillatis linearibus glabris.
ciliare. A. foliis verticillatis obovatis ciliatis hispidis.
scabrum. A. foliis convolutis canaliculato-subulatis scabris.

BETULA.

alnus. B. pedunculis ramosis.

TRIGYNIA.

MYRICA.

cordifolia. M. foliis cordatis sessilibus serratis.
æthiopica. M. foliis ellipticis dentatis, infimis integris.
quercifolia. M. foliis oblongis opposite sinuatis.

BOSCIA.

undulata. B.

TETRAGYNIA.

ILEX.

crocea. I. foliis oblongis serratis: serraturis ciliato-spinosis.

POTAMOGETON.

natans. P. foliis oblongo-ovatis petiolatis.

CLASSIS V.

PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

PLUMBAGO.

P. foliis petiolatis oblongis integris ſubtus glaucis, caule erecto. *capenſis.*

ECHIUM.

E. caule glabro, foliis lanceolatis glabris ciliato-ſpinoſis. *lævigatum.*

E. caule glabro, foliis lanceolatis glabris margine ſcabris. *glabrum.*

E. caule villoſo, foliis linear-enſiformibus ſericeo-tomentoſis, racemo ſpicato lineari. *incanum.*

E. caule glabro ſubtrichotomo, ramis tomentoſis, foliis lanceolatis imbricatis tomentoſis. *trichotomum.*

E. caule glabro, ramis apice foliisque lanceolatis piloſo-hiſpidis. *hiſpidum.*

E. caule pubeſcente, ramis angulatis, foliis piloſo-hiſpidis. *paniculatum.*

E. caule foliisque oblongis obtuſis ſericeis, ſpicis alternis pedunculatis. *fruticoſum.*

E. caule villoſo, foliis enſiformi-ellipticis villoſis, ſpica compoſita lineari-oblonga. *ſpicatum.*

E. caule villoſo, foliis oblongis canaliculatis piloſo-hiſpidis. *trigonum.*

E. caule villoſo, foliis oblongis ſetaceo-hiſpidis, ſpica compoſita ovato-oblonga. *exudatum.*

E. caule villoſo, foliis lanceolatis calloſo-piloſis, ſpicis paniculatis. *capitatum.*

E. caule foliisque lanceolatis acutis ſericeo-villoſis, ſpica terminali ſimplici folioſa. *argenteum.*

HELIOTROPIUM.

H. foliis ovatis plicatis tomentoſis, caule decumbente. *ſupinum.*

LITHOSPERMUM.

scabrum. L. seminibus lævibus, foliis lanceolatis papillo-so-scabris hirsutis.

papillosum. L. seminibus rugosis, foliis lanceolato-ovatis papillosis hirsutis.

BORAGO.

africana. B. foliis oppositis alternisque ovatis piloso hispidis.

CYNOGLOSSUM.

hispidum. C. foliis oblongis obtusis setaceo-hispidis, staminibus corolla brevioribus.

hirsutum. C. foliis lanceolatis villoso-hispidis, seminum aculeis uncinatis.

echinatum. C. foliis lanceolatis obtusis papillosis hirsutis, seminibus subconicis uncinato-aculeatis.

muricatum. C. foliis ovatis villosis scabris, seminibus callo-so-muricatis.

ANCHUSA.

officinalis. A. foliis lanceolatis calloso-villosis, spicis imbricatis secundis.

capensis. A. foliis lanceolatis callosis villosis, racemis trichotomis.

MYOSOTIS.

scorpioides. M. seminibus lævibus, foliis oblongis inferne attenuatis villoso-scabris.

ANAGALLIS.

arvensis. A. foliis ovatis, caule decumbente.

MENYANTHES.

capensis. M. foliis ovatis, caule paniculato-

indica. M. foliis cordatis undulato-crenatis, petiolis floriferis.

RETZIA.

capensis. R.

DATURA.

D. pericarpiis ſpinoſis erectis ovatis, foliis ovatis glabris. *ſtramonium.*

CONVOLVULUS.

C. foliis cordatis exciſis, caule ſarmentoſo. *Falckia.*
C. foliis haſtatis ſagittatisque, pedunculis unifloris, caulibus proſtratis. *ſagittatus.*
C. foliis haſtatis: lobis ſemibifidis, pedunculis ſubbifloris, caule decumbente villoſo. *haſtatus.*
C. foliis palmatis: lobis ſeptenis linearibus integris, pedunculis unifloris, caule decumbente. *multifidus.*
C. foliis cordatis haſtatis dentatis, pedunculis bifido-umbellatis, caule volubili. *cordifolius.*
C. foliis cordatis villoſis trilobis: lobis ovatis acutis, pedunculis unifloris, caule volubili. *trilobus.*
C. foliis ſericeis, inferioribus cordatis dentatis indiviſis, ſuperioribus quinquelobatis, ſupremis palmatis, pedunculis ſubbifloris, caule decumbente volubili. *althæoides.*

CHIRONIA.

C. foliis linearibus glabris, caule herbaceo faſtigiato ramoſo. *linoides.*
C. foliis lineari-lanceolatis glabris, caule herbaceo, ramis patulis. *lychnoides.*
C. foliis lineari-lanceolatis glabris, caule fruticoſo ramoſiſſimo, fructu baccato. *baccifera.*
C. foliis lanceolatis glabris, caule herbaceo cernuo. *jaſminoides.*
C. foliis lanceolatis tomentoſis, caule fruticoſo. *frutescens.*
C. foliis elliptico-oblongis obtuſiuſculis glabris, caule herbaceo ramoſo, calycibus ſubulatis. *nudicaulis.*
C. foliis ovatis glabris, caule ſuffruticoſo, calycibus ovatis carinatis. *tetragona.*

POLEMONIUM.

P. foliis lanceolatis ciliatis. *roëlloides.*
P. foliis lanceolatis glabris. *campanuloides*

IPOMOEA.

simplex. I. foliis lanceolatis *integris*, floribus solitariis

MYRSINE.

africana. M.

ARDUINA.

bispinosa. A.

SIDEROXYLON.

argenteum. S. inerme foliis ovatis retusis tomentosis, flor
bus pedunculatis.

inerme. S. inerme foliis ovatis retusis, floribus pedu
culatis.

melanophleum. S. inerme foliis lanceolato-oblongis, floribu
pedunculatis.

cymosum. S. inerme foliis ovatis, floribus paniculatis.

CESTRUM.

venenatum. C. foliis lanceolato-oblongis coriaceis, floribu
sessilibus.

SOLANUM.

nigrum. S. caule inermi herbaceo, foliis ovatis integri
dentatisque, racemis distichis nutantibus.

*quadrangu-
lare.* S. caule inermi frutescente tetragono, foliis o
vatis integris angulatisque, floribus pani
culatis.

lycopersicum. S. caule inermi herbaceo, foliis pinnatis, folio
lis incisis villosis, racemis aphyllis.

niveum. S. caule aculeato fruticoso, foliis ovatis subtus
tomentoso-niveis integris, panicula decom
posita.

insanum. S. caule aculeato herbaceo, foliis tomentosis,
pedunculis pendulis.

tomentosum. S. caule aculeato fruticoso, foliis cordatis re
pandis tomentosis, floribus solitariis.

mammosum. S. caule aculeato herbaceo, foliis incisis denta
to-lobatis villosis, pedunculis lateralibus u
nifloris.

S.

S. caule aculeato fruticoso, foliis pinnatifido-si- *sodomeum.*
nuatis aculeatis nudis, floribus solitariis.
S. caule aculeato fruticoso, foliis pinnatifido-si- *capense.*
nuatis aculeatis nudis: laciniis alternis in-
tegris obtusis.

PHYSALIS.

P. caule fruticoso villoso, foliis ovatis villosis, *arborescens.*
floribus axillaribus cernuis.
P. caule fruticoso tomentoso, foliis elliptico-ob- *tomentosa.*
longis tomentosis, floribus lateralibus ag-
gregatis.

ATROPA.

A. caule fruticoso. foliis ovatis integris, pedun- *solanacea.*
culis unifloris.

LYCIUM.

L. inerme foliis ovatis glabris, ramis flexuosis, *barbatum.*
floribus paniculatis.
L. spinosum foliis fasciculatis linearibus, ramis *rigidum.*
strictis, florum pedunculis brevissimis.
L. spinosum foliis ovatis obtusis, ramis angula- *tetrandrum.*
tis, corollis 4-fidis.
L. spinosum foliis lanceolatis, ramis laxis, ca- *barbarum.*
lycibus bifidis.
L. spinosum foliis lanceolatis glabris, ramis spi- *cinereum.*
nescentibus, pedunculis brevissimis.
L. spinosum foliis obovatis carnosis glabris, ra- *horridum.*
mis spinescentibus, pedunculis brevissimis.

CEROPEGIA.

C. floribus umbellatis, foliis sagittatis. *sagittata.*
C. floribus umbellatis, foliis linearibus integris. *tenuifolia.*

ECHITES.

E. aculeis binis extrafoliaceis, foliis linearibus sub- *succulenta.*
tus tomentosis, corollis infundibuliformibus.
E. aculeis binis extrafoliaceis, foliis lanceolatis *bispinosa.*
glabris, corollis hypocrateriformibus.

PERGULARIA.

edulis. P. foliis ovatis integris glabris, caule herbaceo volubili.

SCÆVOLA.

lobelia. S.

SAMOLUS.

valerandi. S.

ROËLLA.

ciliata. R. foliis lanceolatis ciliatis, floribus solitariis terminalibus.

squarrosa. R. foliis ovatis dentatis ciliatis, floribus terminalibus aggregatis.

muscosa. R. foliis ovatis dentatis reflexis glabris, floribus terminalibus solitariis.

spicata. R. foliis lanceolatis ciliatis, floribus terminalibus aggregatis.

TRACHELIUM.

tenuifolium. T. foliis linearibus ciliatis.

diffusum. T. foliis linear-subulatis, ramis diffusis.

CAMPANULA.

capillacea. C. foliis linear-filiformibus integris glabris, floribus alternis, calycibus lævibus.

linearis. C. foliis linearibus integris glabris, calycibus hispidis, caule erecto.

sessiliflora. C. foliis linearibus integris glabris, ramis cernuis, floribus subsessilibus.

adpressa. C. foliis lanceolatis dentatis ciliatis, caule erecto, panicula decomposita.

subulata. C. foliis lanceolatis trigonis ciliatis, floribus paniculatis, caule erecto.

hispidula. C. foliis lanceolatis ramisque diffusis hispidis.

paniculata. C. foliis lanceolatis undatis hirtis, caule angulato-hispido, floribus racemosis.

C. so-

C. foliis lanceolatis integris glabris, caule lana- *cinerea.*
to, floribus terminalibus solitariis.
C. foliis lanceolatis denticulatis glabris, caule *unidentata.*
simplici, floribus racemosis.
C. foliis ovatis denticulatis glabris, caule frute- *fasciculata.*
scente, floribus glomeratis.
C. foliis ovatis integris denticulatisque glabris, *tenella.*
caule decumbente, floribus terminalibus so-
litariis.
C. foliis lanceolatis undatis glabris, floribus ra- *undulata.*
cemosis, caule calycibusque glabris.
C. foliis lanceolatis dentato-undatis hirtis, flori- *capensis.*
bus solitariis terminalibus, calycibus hispidis.
C. foliis oblongis undatis hirtis, floribus termi- *cernua.*
nalibus cernuis, calycibus glabris.
C. foliis radicalibus obovatis, caulinis lanceola- *porosa.*
tis, caule punctato-scabro, floribus race-
mosis.
C. foliis ovatis crenatis glabris, caule decum- *procumbens.*
bente, floribus axillaribus solitariis.

LOBELIA.

L. foliis integris linearibus glabris, caule erecto. *linearis.*
L. foliis integris linearibus villosis, caule erecto. *simplex.*
L. foliis integris lanceolatis subtrigonis glabris, *pinifolia.*
caule erecto.
L. foliis integris oblongis obtusis glabris, cau- *depressa.*
le decumbente.
L. foliis integris ovatis hirsutis, caule erecto, *hirsuta.*
pedunculis elongatis.
L. foliis integris dentatisque linearibus, caule *volubilis.*
volubili.
L. foliis lanceolatis crenatis glabris, caule vo- *crenata.*
lubili.
L. foliis digitatis glabris, caule volubili. *cyphia.*
L. foliis pinnatis: pinnis linearibus, caule erecto. *bulbosa.*
L. foliis pinnatis: pinnis ovatis dentatis, sca- *cardamine.*
po erecto.
L. foliis inciso-subpinnatifidis, scapo erecto. *incisa.*
L. foliis oblongis crenatis, scapo erecto. *phyteuma.*

cinerea. L. foliis linearibus dentato-spinosis cinereo-tomentosis, floribus subsessilibus.

tomentosa. L. foliis linearibus dentatis tomentosis, caule erecto, pedunculis longissimis.

debilis. L. foliis linearibus denticulatis glabris, caule erecto.

tenella. L. foliis lanceolatis unidentatis glabris, caule erectiusculo, pedunculis aphyllis.

lutea. L. foliis lanceolatis serratis glabris, caule decumbente, floribus subsessilibus.

crinus. L. foliis lanceolatis serratis glabris, caule flexuoso-erecto, pedunculis axillaribus folio longioribus.

crinoides. L. foliis lanceolatis serratis glabris, caule erecto, pedunculis folio brevioribus.

bifida. L. foliis ovatis dentatis, caule erecto bifido.

bellidifolia. L. foliis ovatis dentatis hirsutis, caule erecto simplici.

secunda. L. foliis obovatis lanceolatisque dentatis glabris, caulibus erectis, floribus racemosis secundis.

patula. L. foliis ovatis sinuato-dentatis villosis, caulibus patulo-diffusis.

anceps. L. foliis obovatis lanceolatisque, caule decumbente ancipiti.

repens. L. foliis obovatis dentatis villosis, caule decumbente villoso.

thermalis. L. foliis ovatis serratis, caulibus decumbentibus piloso-hispidis.

triquetra. L. foliis lanceolatis dentato-pinnatifidis cauleque erecto glabris.

coronopifolia. L. foliis oblongis dentato-pinnatifidis cauleque erecto hirtis, pedunculis elongatis.

minuta. L. foliis rotundatis lobatis: lobis obtusis, pedunculis axillaribus unifloris.

pygmæa. L. foliis rotundatis serratis caulibusque decumbentibus hirsutis.

VIOLA.

tricolor. V. caule trigono decumbente, foliis oblongis, stipulis pinnatifidis.

capensis. V. suffruticosa caule erecto, foliis obovatis serratis. V. anu-

V. caule decumbente ramoso, foliis linearibus integris. *decumbens.*

IMPATIENS.

I. pedunculis unifloris solitariis, foliis ovatis, crenis piliferis. *capensis.*

I. pedunculis unifloris solitariis, foliis oblongis serratis, nectariis longissimis bifidis. *bifida.*

GARDENIA.

G. inermis corollis obtusis, calyce teretiusculo, foliis ovatis acutis. *Thunbergia.*

G. inermis corollis acutis subcampanulatis, calyce glabro, foliis oblongis acutis. *Rothmannia.*

LONICERA.

L. capitulis terminalibus pedunculatis, foliis oblongis integris glabris. *bubalina.*

BRUNIA.

B. foliis trigonis incurvis acutis, floribus in ramis lateralibus terminalibus. *nodiflora.*

B. foliis trigonis apice fuscis, paleis capitulorum coloratis. *paleacea.*

B. foliis trigonis patulis apice fuscis, capitulis globosis fastigiatis. *laungiosa.*

B. foliis trigonis obtusis glabris, ramulis verticillatis fastigiatis, capitulis terminalibus. *verticillata.*

B. foliis lanceolatis glabris squarrosis, capitulis subfastigiatis. *abrotanoides.*

STAVIA.

S. foliis lanceolato-trigonis patulis, calycis radio colorato capitulo breviore. *radiata.*

S. foliis lineari-lanceolatis trigonis patulis, radio calycis colorato capitulo longiore. *glutinosa.*

RORIDULA.

R. *dentata.*

CEANOTHUS.

africanus. C. foliis lanceolatis enerviis, ſtipulis ſubrotundis.

CELASTRUS.

filiformis. C. inermis foliis lanceolatis integris, ramis filiformibus, floribus axillaribus.

microphyllus. C. inermis foliis ovatis obtuſis integris, pauciculis terminalibus.

lucidus. C. inermis foliis ovaris glabris integris marginatis, floribus axillaribus.

laurinus. C. inermis foliis oblongis integris, paniculis axillaribus.

roſtratus. C. inermis foliis oblongo-ovatis integris, paniculis axillaribus, fructibus ſpinoſis.

tetragonus. C. inermis foliis ovatis ſerratis, ramis tetragonis.

acuminatus. C. inermis foliis ovatis acuminatis ſerratis, pedunculis axillaribus unifloris.

cernuus. C. inermis foliis ovatis obtuſis ſerratis, pedunculis axillaribus unifloris cernuis.

procumbens. C. inermis foliis ovatis dentatis, floribus axillaribus, caule decumbente.

undatus. C. inermis foliis obovato-ſubcuneiformibus undato-dentatis, floribus axillaribus ſeſſilibus.

linearis. C. ſpinoſus foliis linearibus integris, paniculis axillaribus.

buxifolius. C. ſpinoſus ramis angulatis, foliis oblongis obtuſis crenatis, paniculis axillaribus.

rotundifolius. C. ſpinoſus foliis petiolatis ſubrotundis dentatis.

pyracanthus. C. ſpinoſus foliis obovatis integris marginatis, paniculis axillaribus.

integrifolius. C. ſpinoſus foliis ovatis integris reflexis, paniculis axillaribus.

DIOSMA.

rubra. D. foliis trigonis mucronatis glabris ſubtus bifariam punctatis.

hirſuta. D. foliis trigonis mucronatis hirſutis, floribus terminalibus ſubſolitariis.

hiſpida. D. foliis trigonis muticis villoſo-hiſpidis patulis, umbellis terminalibus.

D. ſo-

D. foliis lanceolato-trigonis muticis villosis imbricatis, umbellis terminalibus. *pubescens.*

D. foliis lanceolatis carinatis ciliatis, umbellis terminalibus. *ciliata.*

D. foliis trigonis obtusis glabris, floribus terminalibus subsolitariis. *ericoides.*

D. foliis ovatis trigonis glabris imbricatis, floribus terminalibus solitariis. *cupressina.*

D. foliis trigonis obtusis ciliatis, floribus terminalibus. *oppositifolia.*

D. foliis trigonis obtusis villoso-hispidis imbricatis, floribus spicato-capitatis. *capitata.*

D. foliis lanceolatis villosis imbricatis, capitulis terminalibus. *villosa.*

D. foliis linearibus obtusis glabris patulis, floribus terminalibus subsolitariis. *linearis.*

D. foliis lanceolato-ensatis crenatis glabris, capitulis unilocularibus. *ensata.*

D. foliis lanceolatis obtusis subpilosis, floribus axillaribus geminis. *lanceolata.*

D. foliis ovatis rugosis villosis reflexis, umbellis terminalibus. *rugosa.*

D. foliis ovatis glabris marginatis, floribus axillaribus solitariis & geminis. *ovata.*

D. foliis oblongis subtus punctatis, floribus terminalibus, calycibus ciliatis. *uniflora.*

D. foliis ovatis glanduloso-crenatis glabris, floribus axillaribus geminis. *pulchella.*

D. foliis ovatis crenatis subtus punctatis, floribus axillaribus solitariis. *crenata.*

D. foliis subcuneatis crenatis subtus punctatis, floribus lateralibus solitariis. *betulina.*

D. foliis cordatis, inferioribus ovatis, superioribus lanceolatis, umbellis terminalibus. *marginata.*

D. foliis ovatis acutis ciliatis, umbellis terminalibus. *imbricata.*

D. foliis ovatis carinatis ciliatis quadrifariam imbricatis, floribus terminalibus solitariis. *tetragona.*

D. foliis cordatis acutis glabris, umbellis terminalibus. *barbigera.*

CALODENDRUM.

capenſe. C.

RHAMNUS.

tetragonus. R. inermis foliis ovatis integris ſeſſilibus, ramis tetragonis.

celtifolius. R. inermis foliis ovatis ſerratis glabris, floribus axillaribus glabris.

capenſis. R. aculeis ſolitariis, foliis ovatis exciſis integris glabris, umbellis axillaribus.

VITIS.

capenſis. V. foliis quinquangularibus dentatis ſubtus ferrugineo-tomentoſis, floribus ſubcapitatis.

cirrhoſa. V. foliis ternatis villoſis: foliolis ovatis ſerratis.

PLECTRONIA.

ventoſa. P.

PHYLICA.

pinifolia. P. foliis ſubtrigonis obtuſis glabris, floribus ſpicatis.

ſecunda. P. foliis linearibus mucronatis glabris, capitulis terminalibus hirſutis,

eriophoros. P. foliis lanceolatis acutis ſubtus tomentoſis, capitulis terminalibus tomentoſis.

villoſa. P. foliis linearibus, ſuperioribus villoſis, floribus racemoſis.

lanceolata. P. foliis ſparſis lanceolatis ſubtus tomentoſis, capitulis terminalibus hirſutis.

ericoides. P. foliis lanceolatis glabris, ramis ſubumbellatis, capitulis terminalibus tomentoſis.

paruiflora. P. foliis lanceolatis acutis ſcabris, ramis virgatis, capitulis terminalibus tomentoſis.

ſtipularis. P. foliis linearibus ſtipulatis, capitulis terminalibus.

imberbis. P. foliis lanceolatis villoſis, capitulis terminalibus.

ſtrigoſa. P. foliis linearibus hirſutis, capitulis terminalibus lanatis.

P. ſu-

P. foliis lineari-lanceolatis subpubescentibus, bra- *plumosa.*
cteis lunatis, spica oblonga.
P. foliis lineari lanceolatis villosis, bracteis lu- *capitata.*
natis, capitulis terminalibus.
P. foliis cordato-ovatis obtusis subtus tomento- *buxifolia.*
sis, capitulis terminalibus.
P. foliis cordato-ovatis acutis subtus tomento- *callosa.*
sis, capitulis terminalibus.
P. foliis cordatis acuminatis subtus tomentosis, *spicata.*
spicis cylindricis.
P. foliis cordato-ovatis glabris, floribus racemosis. *imbricata.*
P. foliis ovatis glabris, floribus racemosis. *racemosa.*

STRELITZIA.

S. foliis simpliciter nervosis. *angusta.*
S. foliis reticulato-nervosis. *reginæ.*

ACHYRANTHES.

A. caule fruticoso erecto, fructibus reflexis. *aspera: sicula.*

AMARANTHUS.

A. floribus glomeratis axillaribus, bracteis su- *albus.*
bulato-setaceis, foliis ovatis excisis mu-
cronatis.
A. racemis compositis erectis, lateralibus patu- *sanguineus.*
lis, foliis ovato-oblongis.

THESIUM.

T. foliis lanceolatis remotis, ramis striatis erectis. *lineatum.*
T. foliis trigono-ovatis, caule angulato, flori- *fragile.*
bus axillaribus.
T. foliis subulatis spinosis, floribus axillaribus. *spinosum.*
T. foliis trigonis imbricatis scabris, caule tere- *scabrum.*
ti, floribus terminalibus.
T. foliis lineari-lanceolatis acutis, ramis striatis *funale.*
elongatis, floribus subspicatis.
T. foliis lanceolatis decurrentibus, floribus ter- *strictum.*
minalibus subumbellatis.
T. foliis lanceolatis remotis, ramis angulatis *paniculatum.*
diffusis, floribus terminalibus.

T. fo-

squarrosum. T. foliis lanceolatis reflexis, floribus axillaribus pedunculatis.

capitatum. T. foliis trigonis mucronatis lævibus, capitulis terminalibus, bracteis ciliatis.

frisea. T. foliis lineari-lanceolatis, caule decumbente, floribus spicatis.

trisiorum. T. foliis lanceolatis, caule angulato, pedunculis trichotomis.

euphorbioides. T. foliis ovatis acutis carnosis, ramis dichotomis, floribus terminalibus.

colpoon. T. foliis ovatis mucronatis, ramis trichotomis, paniculis terminalibus.

DIGYNIA.

STAPELIA.

pilifera. S. caule aphyllo tereti: mammillis ciliato-aristatis, flore sessili.

mammillaris. S. caule aphyllo hexagono: denticulis reflexis, flore subpedunculato, laciniis corollæ alatis.

incarnata. S. caule aphyllo tetragono: denticulis patentibus, flore sessili, laciniis corollæ obtusis.

hirsuta. S. caule aphyllo tetragono: denticulis erectis, flore pedunculato, corolla hirsuta.

ciliata. S. caule aphyllo tetragono: denticulis patentibus, flore pedunculato, laciniis corollæ ovatis squamosis ciliatis.

fasciculata. S. caule aphyllo subhexagono: denticulis patentibus acutis, flore pedunculato.

variegata. S. caule aphyllo tetragono: denticulis patentibus, flore pedunculato, laciniis corollæ ovatis squamosis maculatis.

caudata. S. caule folioso: foliis lineari-oblongis, flore pedunculato, laciniis corollæ linearibus.

CYNANCHUM.

filiforme. C. caule erecto simplici, foliis linearibus planis,

crispum. C. caule erecto herbaceo, foliis lanceolatis crispis, floribus lateralibus.

obtusifolium. C. caule volubili herbaceo, foliis subrotundis glabris.

C. cau-

C. caule volubili herbaceo, foliis ovatis glabris, umbellis lateralibus. *capense.*

PERIPLOCA.

P. floribus paniculatis hirsutis, foliis oblongis, caule volubili. *secamone.*

P. floribus umbellatis, foliis ovatis hirsutis, caule volubili. *africana.*

APOCYNUM.

A. caule decumbente herbaceo hirto, foliis lineari-filiformibus, floribus umbellatis. *filiforme.*

A. caule volubili herbaceo glabro, foliis lineari-lanceolatis, floribus paniculatis. *lineare.*

A. caule volubili herbaceo piloso, foliis lanceolatis, umbellis lateralibus subtrifloris. *triflorum.*

A. caule volubili herbaceo striato glabro; foliis lanceolatis, umbella triflora. *lanceolatum.*

A. caule volubili hirto, foliis ovatis subtus villosis. *cordatum.*

A. caule decumbente herbaceo, foliis hastatis. *Apocynum minutum.* Linn. Syst. 258. *hastatum.*

ASCLEPIAS.

A. caulo aphyllo. *aphylla.*

A. foliis lineari-filiformibus, umbellis lateralibus pedunculatis, caule erecto. *filiformis.*

A. foliis lanceolatis glabris, caule fruticoso. *fruticosa.*

A. foliis lanceolatis undatis pilosis, umbella terminali, corollis glabris. *crispa.*

A. foliis oblongo-lanceolatis undatis, umbellis lateralibus, corollis barbatis. *undulata.*

A. foliis oblongis mucronatis glabris, umbellis axillaribus. *mucronata.*

A. foliis oblongis piloso-scabris, pedunculis axillaribus. *grandiflora.*

A. foliis alternis ovatis mucronatis, caule fruticoso villoso. *arborescens.*

GENTIANA.

G. foliis cordatis, calycibus membranaceo-carinatis. *exacoides.*

G. fo-

albens. G. foliis ovatis amplexicaulibus, calycibus ovatis, caule trichotomo.

dubia. G. foliis . . . ., corollis quadrifidis, calyce lanceolato, paricula terminali trichotoma supradecomposita.

LINCONIA.

alopecuroidea. L.

SALSOLA.

diffusa. S. herbacea tomentosa decumbens, foliis lanceolatis.

fruticosa. S. fruticosa erecta, foliis filiformibus obtusis.

aphylla. S. arborescens subaphylla.

CHENOPODIUM.

mucronatum. C. foliis triangulari-hastatis obtusis mucronatis, racemis foliosis.

murale. C. foliis ovatis dentatis acutis, racemis ramosis nudis.

ambrosioides. C. foliis lanceolatis subdentatis, summis integris, racemis foliatis.

microphyllum. C. foliis ovatis integris glaucis, caule fruticoso.

halimus. C. foliis deltoidibus integris glaucis, caule fruticoso.
Atriplex halimus. Linn. Syst. 909. Sp. 1492.

vestitum. C. foliis ovatis obtusis glaucis, caule fruticoso decumbente.
Atriplex glauca. Linn. Syst. 909. Sp. 1493.

laciniatum. C. foliis oblongis sublinistutis dentatis, caule erecto herbaceo, racemis aphyllis.
Atriplex laciniata? Linn. Syst. 909. Sp. 1494.

HERNIARIA.

lenticulata. H. suffruticosa hirsuta, foliis ovatis.

VAHLIA.

capensis. V.

HYDROCOTYLE.

H. foliis peltatis, umbellis quinquefloris. *vulgaris.*
H. foliis reniformibus denticulatis. *asiatica.*
H. foliis obovatis glabris. *glabra.*
Centilla glabrata. Linn. Spec. 1393.
H. foliis cordatis integris villosis. *villosa.*
Centella villosa. Linn. Spec. 1393.
H. foliis obovatis dentatis tomentosis. *tomentosa.*
Solandra capensis. Linn. Gen. 1061. Sp. 1407.
Hydrocotyle solandra. Linn. Syst. 272.
H. foliis cuneatis trifidis villosis. *tridentata.*
H. foliis lineari-lanceolatis hirsutis integris. *linifolia.*
H. foliis linearibus glabris. *virgata.*

CUSSONIA.

C. foliis quinatis: foliolis simplicibus ternatisque cuneatis apice dentatis. *thyrsiflora.*
C. foliis septenis: foliolis simplicibus ternatisque lanceolatis apice serratis. *spicata.*

SANICULA.

S. foliis radicalibus compositis: foliolis ovatis. *canadensis.*

ARCTOPUS.

A. *echinatus.*

ASTRANTIA.

A. foliis lanceolatis serrato-ciliatis. *ciliaris.*

CAUCALIS.

C. umbella trifida, umbellulis quinis, foliis bipinnatifidis hirsutis. *africana.*

OENANTHE.

O. foliorum inferiorum pinnis ovatis, superiorum linearibus, petiolis angulatis. *inebrians.*
O. foliis bipinnatis: pinnis linearibus, summis indivisis. *tenuifolia.*

ferulacea. O. foliis ſupradecompoſitis: pinnulis ſubulatis ſulcatis.
interrupta. O. foliis interrupte bipinnatis: laciniis inciſo-ſerratis.
exaltata. O. caule ſtriato, ſeminibus turbinatis ſtriatis.

LACERPITIUM.

capenſe. L. foliolis ovatis integris mucronatis.

PEUCEDANUM.

capillaceum. P. foliis bipinnatis: laciniis capillaceis ſulcatis.
tenuifolium. P. foliis bipinnatiſidis: laciniis lanceolatis oppoſitis alternisque marginatis.

CONIUM.

africanum. C. ſeminibus muricatis, petiolis pedunculisque lævibus.
rigens. C. ſeminibus ſubmuricatis, pedunculis ſulcatis, foliolis canaliculatis.
rugoſum. C. ſeminibus rugoſis.

BUPLEURUM.

ciliatum. B. foliis ovatis ciliatis ſubtus tomentoſis.
giganteum. B. foliis oblongis ſerratis utrinque tomentoſis.
Hermas gigantea. Linn. Syſt. 913. Suppl. 435.
capitatum. B. foliis ovatis inciſo crenatis ſubtus tomentoſis.
Hermas capitata. Linn. Syſt. 913. Suppl. 435.
quinquedentatum. B. foliis ovatis quinquedentatis ſubtus tomentoſis.
Hermas 5-dentata. Linn. Syſt. 913. Suppl. 436.
villoſum. B. foliis ſeſſilibus oblongis dentatis tomentoſis.
diſforme. B. fruteſcens foliis filiformibus triſidis.
arboreſcens. B. fruteſcens foliis petiolatis ovatis glabris.

SIUM.

filifolium. S. foliis filiformibus, involucris elongatis.
angustifolium. S. foliis pinnatis, umbellis axillaribus pedunculatis.
grandiflorum. S. foliis bipinnatis: foliolis ſubrotundis inciſo-dentatis.

S. fo-

foliis bipinnatis: foliolis linearibus incisо- pinnatifidis. *paniculatum.*
foliis bipinnatis: foliolis trifidis, ramis diffusis. *patulum.*
foliis tripinnatis, pedunculis pedicellisque scabris. *asperum.*
foliis tripinnatis, petiolis pedunculisque scabris. *hispidum.*
foliis tripinnatifidis, laciniis ovatis incisо-serratis villosis. *villosum.*

BUBON.

foliolis rhombeis dentatis striatis, umbellis paucis. *galbanum.*

CHÆROPHYLLUM.

caule lævi æquali, seminibus sulcatis, foliolis trifidis glabris. *capense.*

SESELI.

foliis filiformibus, caule flexuoso-erecto. *filifolium.*
petiolis ramеis membranaceis emarginatis, caule stricto, pinnulis subulatis sulcatis. *striatum.*
petiolis ramеis membranaceis ventricosis integris, caule dichotomo paniculato, foliis supradecompositis glabris. *chærophylloides.*

SMYRNIUM.

foliis caulinis ternatis incisis serratis, umbellis lateralibus sessilibus. *laterale.*

ANETHUM.

seminibus compressis. *graveolens.*
seminibus ovatis. *fœniculum.*

PIMPINELLA.

foliis supradecompositis: laciniis acutis, caule striato. *capense.*

TRIGYNIA.

RHUS.

angustifolium. R. foliis ternatis: foliolis lineari-lanceolatis integris subtus tomentosis.

lanceum. R. foliis ternatis: foliolis lanceolatis integris glabris.

pubescens. R. foliis ternatis: foliolis obovatis mucronatis glabris, ramis villosis.

lævigatum. R. foliis ternatis: foliolis ovatis acuminatis integris glabris.

cirrhiflorum. R. foliis ternatis: foliolis ovatis mucronatis integris glabris, caule cirrhis scandente.

lucidum. R. foliis ternatis: foliolis obovatis rotatis glabris.

villosum. R. foliis ternatis: foliolis ovatis integris villosis.

tridentatum. R. foliis ternatis: foliolis obovatis tridentatis glabris, caule cirrhifero scandente.

dentatum. R. foliis ternatis: foliolis obovatis inucronato-dentatis glabris, caule scabro.

tomentosum. R. foliis ternatis: foliolis ovatis dentatis subtus tomentosis.

sinuatum. R. foliis ternatis: foliolis ovatis obtusis sinuatis subtus villosis.

cuneifolium. R. foliis ternatis: foliolis cuneiformibus septem-dentatis glabris.

incisum. R. foliis ternatis: foliolis inciso-pinnatifidis subtus tomentosis.

digitatum. R. foliis quinatis, caule scandente cirrhifero.

pauciflorum. R. foliis pinnatis: foliolis alternis decurrentibus serratis.

alatum. R. foliis pinnatis: foliolis ovatis apice serratis, petioli internodiis omnibus alatis.

CASSINE.

capensis. C. foliis petiolatis ovatis retusis crenatis, paniculâ folio breviore.

colpoon. C. foliis petiolatis ovatis crenatis, panicula longitudine folii.

maurocenia. C. foliis sessilibus ovatis.

PASSIFLORA.

P. foliis palmatis integris. *cærulea.*

CLUTIA.

C. foliis subsessilibus lineari-lanceolatis glabris, floribus solitariis erectis. *alaternoides.*

C. foliis petiolatis lanceolatis glabris, floribus solitariis erectis. *polygonoides.*

C. foliis subpetiolatis lanceolatis glabris, floribus binis axillaribus erectis. *ericoides.*

C. foliis subpetiolatis lanceolatis villosis, floribus axillaribus cernuis. *pubescens.*

C. foliis obovatis tomentosis. *tomentosa.*

C. foliis inferioribus ovatis, superioribus lanceolatis glabris. *heterophylla.*

C. foliis petiolatis ovatis glabris, floribus binis axillaribus. *pulchella.*

C. foliis ovatis mucronatis glabris, floribus lateralibus solitariis. *acuminata.*

C. foliis obovatis integris glabris, floribus lateralibus glomeratis hirsutis. *hirta.*

ALSINE.

A. petalis bipartitis, foliis ovato-cordatis. *media.*

CORRIGIOLA.

C. *littoralis.*

PHARNACEUM.

P. foliis linearibus, umbellis lateralibus, ramis diffusis dichotomis. *lineare.*

P. foliis linearibus, panicula dichotoma, caule erecto. *dichotomum.*

P. foliis tereti-subulatis falcatis, umbellis glomerato-subsessilibus, caule diffuso. *glomeratum.*

P. foliis filiformibus mucronatis, umbellis lateralibus, caule erecto frutescente. *teretifolium.*

P. foliis filiformibus mucronatis, umbellis terminalibus compositis. *album.*

incanum. P. foliis teretibus mucronatis, ſtipulis ſetaceis, umbellis terminalibus.

microphyllum. P. foliis teretibus obtuſis, ſtipulis lanatis, umbellis terminalibus.

quadrangulare. P. foliis lanceolatis quadrifariam imbricatis, umbellis terminalibus.

marginatum. P. foliis ovatis marginatis obtuſis, floribus axillaribus ſubſilibus.

ſerpylliſolium. P. foliis ovatis obtuſis, pedunculis axillaribus unifloris.

cordifolium. P. foliis obovatis mucronatis, umbella terminali compoſita.

PENTAGYNIA.

STATICE.

purpurata. S. caule folioſo, foliis obovatis mucronatis.

longifolia. S. caule paniculato ſcabro erecto, foliis obovato-linearibus.

linifolia. S. caule fruticoſo ramoſo, ramis foliisque linearibus ſcabris.

ſcabra. S. foliis radicalibus obovato-oblongis obtuſis, ramis ſcabris.

tetragona. S. ſcapo paniculato tetragono, foliis obovatis.

CRASSULA.

umbellata. C. foliis ſubpetiolatis ovatis obtuſis integris, caule capillari erecto, floribus umbellatis.

decumbens. C. decumbens foliis ſubulatis.

muſcoſa. C. foliis connatis ovatis acutis integris quadrifariam imbricatis, floribus lateralibus.

glomerata. C. foliis connatis remotis lanceolatis, caule dichotomo, floribus glomeratis.

natans. C. foliis lineari-oblongis, floribus quadrifidis, caule ſimplici.

proſtrata. C. decumbens pellucida, foliis lanceolatis acutis.

pellucida. C. foliis ſubpetiolatis ovato-lanceolatis, floribus ſubumbellatis, caule filiformi diffuſo pellucido.

inanis. C. foliis perfoliatis ovatis, floribus quadrifidis, caule ſimplici.

C. fo-

C. foliis connatis oblongis remotis, caule ſimplici, panicula compoſita, pedicellis retroflactis. *retroflexa.*

C. foliis connatis trigonis ciliato-ſcabris, ramis tetragonis, caule fruteſcente. *muricata.*

C. foliis ſubulatis pruinoſo-ſcabris, floribus paniculatis, caule fruticoſo. *pruinoſa.*

C. foliis connatis trigonis patulis, caule decumbente, ramis erectis ſuperne filiformibus, panicula compoſita. *tetragona.*

C. foliis connatis trigonis glabris reflexis, caule fruteſcente. *fruticuloſa.*

C. foliis perfoliatis ovatis ciliatis patulis, panicula compoſita ſubſpicata. *thyrſiflora.*

C. foliis connatis lineari-ſubulatis, caule ſubaphyllo, floribus verticillatis. *ſpicata.*

C. foliis perfoliatis tereti-ſubulatis ciliatis patulis, caule ramoſo, floribus capitatis. *ſubulata.*

C. foliis connatis tereti ſubulatis integris remotis, caule fruteſcente ramoſo erecto, panicula compoſita. *ramoſa.*

C. foliis perfoliatis lanceolato-ſubulatis ciliatis patulis, caule ſimplici, panicula compoſita. *cymoſa.*

C. foliis connatis tereti-trigonis glabris mollibus remotis, caule erecto ſimplici, panicula trichotoma ſupradecompoſita. *mollis.*

C. foliis connatis ovato-ſubulatis villoſis, caule ramoſo, floribus paniculatis. *pubeſcens.*

C. foliis connatis ſubtrigonis papuloſo-ſcabris, caule retrorſum ſcabro ramoſo, panicula compoſita. *ſcabra.*

C. foliis connatis lineari-oblongis obtuſis integris, capitulis lateralibus pedunculatis. *cephalophora.*

C. foliis connatis ovatis acutis ciliatis, caule ſubaphyllo, floribus capitato-aggregatis. *montana.*

C. foliis connatis quadrifariam imbricatis ovato-oblongis acutis ciliatis. *turrita.*

C. foliis connatis ovatis acutis integris quadrifariam imbricatis, capitulis pedunculatis. *alpeſtris.*

C. foliis connatis oblongis cartilagineo-ciliatis patulis, floribus verticillato-capitatis. *capitella.*

perfoliata. C. foliis connatis lanceolatis acutis tomentosis remotis, panicula decomposita.

obvallata. C. foliis connatis ovatis ciliatis, caule subtecto, panicula supradecomposita.

centauroides. C. foliis sessilibus cordato-ovatis integris remotis, caule flaccido, floribus umbellatis.

dichotoma. C. foliis subpetiolatis ovatis obtusis, floribus umbellatis, caule filiformi flaccido.

marginata. C. foliis connatis ovatis margine membranaceis, pedunculis unifloris, caule debili.

tomentosa. C. foliis connatis lanceolatis villosis ciliatis, caule subaphyllo, floribus verticillatis.

crenulata. C. foliis connatis lanceolatis punctato-crenulatis remotis, panicula decomposita.

perforata. C. foliis connato-perfoliatis ovatis ciliatis remotis, caule erecto paniculato.

pyramidalis. C. foliis connatis quadrifariam imbricatis ovatis obtusis integris, capitulis sessilibus.

deltoidea. C. foliis connatis deltoideis, caule tecto, floribus paniculatis.

cultrata. C. foliis connatis obovatis obliquis integris remotis, caule elongato, floribus paniculatis.

ciliata. C. foliis connatis oblongis ciliatis patulis, caule elongato, panicula composita subrotunda.

coccinea. C. foliis connatis ovatis ciliatis, caule tecto, floribus capitatis.

rupestris. C. foliis connatis ovatis integris glabris, caule tecto, panicula supradecomposita.

cotyledonis. C. foliis connatis oblongis tomentosis ciliatis, caule subaphyllo, floribus paniculatis aggregatis.

argentea. C. foliis connatis ovatis integris argenteis, caule tecto, panicula supradecomposita.

lactea. C. foliis obovatis subciliatis albo-punctatis perfoliatis, panicula trisida.

tecta. C. foliis connatis ovatis obtusis laminnloso-cinereis, scapo aphyllo. floribus sessilibus.

corallina. C. foliis connatis deltoideis obtusis, caule tecto, floribus umbellatis.

vestita. C. foliis connatis deltoideis obtusis, caule tecto, floribus terminalibus capitatis.

C. fo-

C. foliis connatis orbiculatis ciliatis hemiſphæ- *columnaris.*
rice imbricatis, caule tecto, floribus ca-
pitatis.

C. foliis connatis ovato-oblongis ciliatis paten- *orbicularis.*
tibus, caule ſubaphyllo thyrſiflore.

C. foliis connatis crenatis ſubrotundis, caule ſub- *ſeptas.*
aphyllo umbelliſero.
Septas capenſis. Linn. Sp. 489. Syſt. 353.

C. foliis connatis ſubrotundis ciliatis hemiſphæ- *hemiſphærica.*
rice imbricatis, caule aphyllo thyrſiflore.

C. foliis connatis orbiculatis barbatis hemiſphæ- *barbata.*
rice imbricatis, caule ſubaphyllo, floribus
verticillatis.

C. foliis petiolatis ſubrotundis integris, pedun- *minima.*
culis uniſloris.

C. foliis petiolatis cordatis, floribus ſolitariis. *cordata.*

C. foliis petiolatis ſpathulatis crenatis, panicula *ſpathulata.*
decompoſita trichotoma.

C. foliis petiolatis cordatis dentatis. *dentata.*

LINUM.

L. foliis oppoſitis lineari-lanceolatis, caule fru- *africanum.*
teſcente.

L. foliis oppoſitis ovatis mucronatis, caule fru- *æthiopicum.*
ticoſo.

L. foliis quaternis. *quadrifolium.*

DROSERA.

D. acaulis flore radicali ſeſſili. *acaulis.*

D. foliis radicalibus ovatis, floribus racemoſis. *cuneifolia.*

D. caule erecto biſido, foliis lanceolatis. *capenſis.*

D. caule ſimplici, foliis lanceolatis. *ciſtiflora.*

CLASSIS VI.

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

COMMELINA.

africana. C. corollis inæqualibus, foliis lanceolatis glabris, caule decumbente.

bengalensis. C. corollis inæqualibus, foliis ovatis hirsutis, caule repente.

speciosa. C. caule flexuoso-erecto, foliis amplexicaulibus lanceolatis, floribus glomeratis axillaribus. *Tradescantia speciosa.* Linn. Syst. 315. Suppl. 192.

FRANKENIA.

nothria. F. caule decumbente glabro, vaginis foliorum ciliatis.
Nothria repens. Berg. Plant. cap. 171.

LORANTHUS.

glaucus. L. pedunculis axillaribus unifloris, foliis ovatis glaucis.

LEUCOIUM.

strumosum. L. spatha diphylla multiflora, stylo basi inflato plicato, foliis linear-filiformibus.

HÆMANTHUS.

spiralis. H. scapo filiformi spirali, foliis filiformibus.
Crinum tenellum. Linn. Syst. 319. Suppl. 194.

undulatus. H. scapo tereti, limbi laciniis ovatis undulatis.
Amaryllis undulata. Linn. Syst. 320.

falcatus. H. foliis linearibus falcatis, corollæ laciniis ereCtis lanceolatis.
Crinum falcatum. Linn. Syst. 319.

sarniensis. H. foliis linearibus, corollæ laciniis reflexis.
Amaryllis sarniensis. Linn. Syst. 320.

H. so-

H. foliis enſiformibus obliquis, limbi laciniis lanceolatis. *toxicarius.*
Amaryllis diſticha. Linn. Syſt. 320. Suppl. 195.

H. foliis ovato-oblongis glabris, corollæ laciniis ringentibus. *orientalis.*
Amaryllis orientalis. Linn. Sp. 422. Syſt. 330.

H. foliis oblongis ciliatis, corollæ laciniis reflexis. *ciliaris.*
Amaryllis ciliaris. Linn. Sp. 422. Syſt. 320.

H. foliis linguæformibus piloſis. *pubeſcens.*

H. foliis petiolatis oblongis erectis undulatis glabris. *puniceus.*

H. foliis ſeſſilibus linguæformibus decumbentibus glabris. *coccineus.*

CRINUM.

C. foliis linearibus obtuſis, corollis cylindricis: laciniis alternis intus glanduloſis. *angustiſolium.*

C. foliis linearibus, corollis campanulatis: laciniis duabus anguſtioribus. *lineare.*

C. foliis lanceolatis obliquis, limbi laciniis alternis extus glanduloſis. *obliquum.*

C. foliis enſiformibus, corollis campanulatis: laciniis alternis calloſo-unguiculatis. *ſpecioſum.*

C. foliis linear-enſiformibus canaliculatis, corollis campanulatis: laciniis enſiformibus. *longiſolium.*
Amaryllis longifolia. Linn. Syſt. p. 320.

GETHYLLIS.

G. foliis linearibus ſpiralibus glabris, limbi laciniis ovato-oblongis. *ſpiralis.*

G. foliis linearibus ciliatis, limbi laciniis ovato-oblongis. *ciliaris.*

G. foliis linear-filiformibus ſpiralibus villoſis, limbi laciniis ovato-oblongis. *villoſa.*

G. foliis lanceolatis planis, limbi laciniis lanceolatis. *lanceolata.*

HYPOXIS.

H. foliis trigonis carnoſis glabris, ſcapis bifidis. *minuta.*

H. fo-

alba. H. foliis teretibus glabris, scapis bifidis, petalis immaculatis.

stellata. H. foliis planis integris glabris, scapis simplicibus unifloris, petalis basi fusco-maculatis. *Amaryllis capensis.* Mant. 363.

serrata. H. foliis canaliculatis glabris ciliato-serratis, scapis unifloris.

plicata. H. foliis plicatis ciliatis, scapis simplicibus.

villosa. H. foliis lineari-ensiformibus villosis, scapis divisis.

ovata. H. foliis ovato-lanceolatis integris glabris, scapis unifloris.

AGAVE.

americana. A. foliis dentato-spinosis.

TULBAGIA.

alliacea. T. nectario monophyllo, foliis ensiformibus, floribus cernuis.

cepacea. T. nectario triphyllo, foliis linearibus, floribus erectis.

MASSONIA.

latifolia. M. foliis rotundato-ovatis glabris.

lanceolata. M. foliis lanceolatis integris glabris.

undulata. M. foliis lanceolatis undulatis glabris.

echinata. M. foliis ovatis muricatis pilosis.

MAUHLIA.

linearis. M. foliis linearibus scapo brevioribus. *Crinum africanum.* Linn. Syst. 319. Sp. 419.

ensifolia. M. foliis lanceolato-ensiformibus scapo longioribus.

ALETHRIS.

capensis. A. acaulis foliis oblongis undulatis, racemo oblongo, floribus nutantibus.

uvaria. A. acaulis foliis ensiformibus canaliculatis, spica oblonga, floribus nutantibus.

ALO-

ALOË.

A. ramis dichotomis, foliis enſiformibus ſerratis. *dichotoma.*
A. caulescens foliis planis enſiformibus dentatis, floribus ſpicatis campanulatis horizontalibus. *ſpicata.*
A. caulescens foliis enſiformibus dentatis erectis, floribus racemoſis reflexis cylindricis. *perfoliata.*
A. caulescens foliis enſiformibus dentatis pictis patentibus, floribus racemoſis reflexis cylindricis. *picta.*
A. caulescens foliis enſiformibus ſinuato-ſerratis reflexis, floribus racemoſis erectis cylindricis. *ſinuata.*
A. acaulis foliis trigonis ſubulatis aculeatis, floribus racemoſis reflexis cylindricis. *humilis.*
A. acaulis foliis trigonis cuſpidatis ciliatis, floribus ſubſpicatis erectis cylindricis. *arachnoides.*
A. acaulis foliis trigonis cuſpidatis papilloſis, floribus racemoſis cernuis cylindricis. *pumila.*
A. acaulis foliis enſiformibus acutis papilloſis diſtichis, floribus racemoſis reflexis clavatis. *diſticha.*
A. acaulis foliis linguæformibus glabris pictis, floribus racemoſis cernuis curvatis. *maculata.*
A. ſubacaulis foliis linguæformibus denticulatis glabris, floribus racemoſis erectis cylindricis. *lingua.*
A. ſubacaulis foliis triſariis pictis canaliculatis: angulis cartilagineis, floribus racemoſis cylindricis. *variegata.*
A. ſubcaulescens foliis imbricatis triſariis ovatis, floribus racemoſis cernuis cylindricis. *viſcoſa.*
A. ſubcaulescens foliis imbricatis octoſariis ovatis, floribus racemoſis recurvis. *ſpiralis.*
A. acaulis foliis quinquefariis deltoideis. *retuſa.*

ORNITHOGALUM.

O. foliis filiformibus carnoſis, floribus reflexis. *rupeſtre.*
O. foliis lineari-enſiformibus ciliatis, floribus racemoſis, pedunculis incurvis. *piloſum.*
O. foliis linearibus integris glabris, racemo ſpicato erecto. *graminifolium.*

O. fo-

albucoides. O. foliis linearibus canaliculatis glabris, racemo erecto.

bracteatum. O. foliis enſiformibus acuminatis, bracteis floribus longioribus.

maculatum. O. foliis lanceolatis, floribus ſecundis: petalis tribus exterioribus brevioribus fuſco-maculatis.

thyrſoides. O. foliis enſiformibus, racemo ovato ſubfaſtigiato.

altiſſimum. O. foliis oblongo-ellipticis, racemo longiſſimo, bracteis ſetaceis.

crenulatum. O. foliis oblongis obtuſis ciliatis, racemo erecto.

ovatum. O. foliis ovatis integris glabris, racemo ovato.

ciliatum. O. foliis ovatis acutis ciliatis, racemo erecto.

capenſe. O. foliis cordatis petiolatis.

nanum. O. foliis obovatis, ſcapo elavato, floribus ſpicatis aggregatis carnoſis.
Fritillaria nana. Linn. Syſt. 325.

undulatum. O. foliis enſiformibus undatis, ſcapo ſubcylindrico, racemo comoſo brevi.

punctatum. O. foliis enſiformibus canaliculatis, ſcapo cylindrico, racemo longiſſimo comoſo, floribus remotis.

ANTHERICUM.

filifolium. A. foliis filiformibus ſcapo erecto brevioribus.

triquetrum. A. foliis filiformibus trigonis racemo ovato brevioribus.

ſpiratum. A. foliis tereti-filiformibus flexuoſis ſcapo flexuoſo brevioribus.

filiforme. A. foliis linari-filiformibus ſcapo ramoſo brevioribus, racemis elongatis.

revolutum. A. foliis linearibus ſcapo longioribus.

flexifolium. A. foliis linearibus ſpiralibus ſcapo ramoſo longioribus.

brevifolium. A. foliis lanceolatis breviſſimis, floribus remotiſſimis.

aloides. A. foliis carnoſis ſemiteretibus racemo cernuo brevioribus.

incurvum. A. foliis carnoſis trigonis incurvis breviſſimis, racemo elongato cernuo.

A. fo-

A. foliis lineari-enſiformibus ſcapo brevioribus, racemo ovato cernuo. *nutans.*

A. foliis enſiformibus caule ramoſo brevioribus, floribus remotisſimis. *contortum.*

A. foliis enſiformibus canaliculatis ſcapo brevioribus, racemo oblongo erecto. *pauciflorum.*

A. foliis trigonis ſerrulatis ſcapo ramoſo ſcabro longioribus, pedunculis fructiferis recurvis. *ſcabrum.*

A. foliis lineari-enſiformibus ſcapo ſimplici brevioribus, racemo erecto longisſimo. *lagopus.*

A. foliis carnoſis ſemiteretibus ſcapo brevioribus, racemo erecto longisſimo. *favoſum.*

A. foliis canaliculato-enſiformibus ſcapo longioribus, racemo oblongo erecto. *caudatum.*

A. foliis carnoſis lineari-enſiformibus hiſpidis ſcapo longioribus. *hiſpidum.*

A. foliis enſiformibus falcatis undulatis ſcapo longioribus. *undulatum.*

A. foliis lineari-enſiformibus falcatis margine muricatis, ſcapo ramoſo glabro. *fimbriatum.*

A. foliis linearibus hirſutis ſcapo ramoſo brevioribus, racemo longisſimo. *hirſutum.*

A. foliis linearibus muricatis ſtriatis, ſcapo ramoſo inferne muricato. *muricatum.*

A. foliis enſiformibus ſulcatis glabris, ſcapo ramoſo. *ſulcatum.*

A. foliis enſiformibus glabris, ſcapo ramoſo comoſo. *comoſum.*

A. foliis lato-enſiformibus glabris ſcapo brevioribus, racemo longisſimo. *latifolium.*

A. foliis enſiformibus carnoſis ciliatis ſcapo ſimplici æqualibus, racemo longisſimo. *ciliatum.*

A. foliis ellipticis criſpis ciliatis, ſcapo ramoſo. *criſpum.*

A. foliis oblongis obtuſis marginatis ſcapo ſimplici brevioribus, racemo ſubumbellato. *marginatum.*

LANARIA.

L. *plumoſa.*

HYACINTHUS.

H. corollis ſexpartitis, racemo cernuo, foliis ſcapo brevioribus, *brevifolius.*

H. co-

corymbosus. H. corollis infundibuliformibus, racemo erecto, foliis scapo longioribus.

convallarioides. H. corollis campanulatis ovatis pendulis, scapo filiformi.

flexuosus. H. corollis campanulatis, racemo erecto, foliis linearibus scapo longioribus.

revolutus. H. corollis ovatis campanulatis reflexis, foliis lanceolatis subundulatis.

LACHENALIA.

contaminata. L. corollis campanulatis sessilibus, foliis linearibus scapo longioribus.
Phormium orchioides. ε. Nov. Gener. Plant. P. 5. p.

orchioides. L. corollis campanulatis subsessilibus, foliis lanceolatis scapo brevioribus.
Phormium hyacinthoides. Linn. Syst. 336.

hirta. L. corollis campanulatis pedunculatis, foliis linearibus hirtis.
Phormium hirtum. δ. Nov. Plant. Gener. P. 5. p. 96.

pallida. L. corollis campanulatis pedunculatis horizontalibus, foliis lanceolatis scapum æquantibus.
Phormium orchioides. γ. Nov. Plant. Gener. P. 5. p. 96.

reflexa. L. corollis ventricosis subsessilibus erectis, foliis ensiformibus reflexis scapo longioribus.
Phormium orchioides. α. Nov. Plant. Gener. P. 15. p. 96.

tricolor. L. corollis cylindricis pedunculatis pendulis: laciniis interioribus excisis, foliis lanceolatis scapo brevioribus.

pendula. L. corollis cylindricis pedunculatis cernuis: laciniis interioribus integris, foliis ensiformibus scapo longioribus.
Phormium alooides. β. Nov. Plant. Gener. P. 5. p. 94

viridis. L. corollis cylindricis: laciniis exterioribus setacco-acuminatis, foliis linearibus brevioribus.

SAN-

SANSEVIERIA.

S. acaulis foliis lanceolatis carnosis, floribus gc- minatis. *thyrsiflora.*
Alethris hyacinthoides: guineensis. Linn. Syſtem. 336.

S. acaulis foliis linguæformibus convolutis, racemo oblongo, floribus erectis. *æthiopica.*
Alethris hyacinthoides: zeilanica? Linn. Syſtem. 336.

ALLIUM.

A. caule planifolio umbellifero, umbella globoſa, ſtaminibus tricuſpidatis, petalis carina ſcabris. *ampeloprasum.*

A. caule planifolio bulbifero, bulbo compoſito, ſtaminibus tricuſpidatis. *ſativum.*

CYANELLA.

C. foliis lineari-filiformibus. *alba.*
C. foliis enſiformibus planis, ramis erectis. *lutea.*
C. foliis lanceolatis undatis, ramis divaricatis. *capenſis.*

ALBUCA.

A. foliis lanceolatis. *major.*
A. foliis filiformi-ſubulatis. *minor.*
A. foliis lanceolato-enſiformibus, floribus erectis, panicula faſtigiata. *faſtigiata.*
A. foliis linearibus villoſo-viſcoſis. *viſcoſa.*
A. foliis ſpiralibus. *ſpiralis.*

TULIPA.

T. caule polyphyllo multifloro. *breyniana.*

ASPARAGUS.

A. caulescens erectus, foliis lineari-lanceolatis ſubfalcatis obtuſis. *ſtriatus.*

A. caulescens erectus, foliis lanceolatis acuminatis ſeſtilibus, floribus lateralibus. *erectus.*
Dracæna erecta. Linn. Syſt. 334.

volubilis. A. caule volubili, foliis lanceolatis.
Dracæna volubilis. Linn. Syst. 334.

undulatus. A. caulescens erectus, foliis ovatis acutis multinerviis, floribus axillaribus pedunculatis.
Dracæna undulata. Linn. Syst. 334.

medeoloides. A. herbaceus volubilis, foliis ovatis nervosis.
Dracæna medeoloides. Linn. Syst. 334.

declinatus. A. caule inermi tereti, ramis deciinatis, ramis setaceis.

flexuosus. A. herbaceus inermis, caule flexuoso, foliis lanceolatis.

albus. A. aculeis solitariis reflexis, caule ramisque angulatis, foliis trigonis.

subulatus. A. fruteseens inermis, ramis retroflexis, foliis tereti-subulatis.

dependens. A. fruticosus aculeatus, ramis reflexis, foliis subulatis.

capensis. A. spinis subternis, ramis aggregatis, foliis filiformibus.

scandens. A. herbaceus inermis volubilis, foliis lanceolatis falcatis.

lanceus. A. aculeis solitariis, foliis lanceolatis subfalcatis, pedunculis axillaribus solitariis.

EHRHARTA.

mermateia. E. foliis vaginatis crispis, corolla rugosa obtusa.
aristata. E. foliis planis, corolla rugosa aristata.
digyna. E. foliis planis, corollis lævibus obtusis costatis.

JUNCUS.

punctorius. J. culmo aphyllo tereti, folio subulato, paniculæ compositæ coarctata.

cephalotes. J. culmo aphyllo tereti, foliis canaliculatis, capitulis subumbellatis.

bufonius. J. culmo dichotomo, foliis setaceis, floribus alternis solitariis sessilibus.

capensis. J. culmo aphyllo compresso, capitulis sessilibus pedunculatisque.

serratus. J. foliis ensiformibus serratis, paniculæ vaginis perfoliatis.

ME-

MELANTHIUM.

M. foliis lanceolatis cucullatis. *capense.*
M. foliis enſiformibus diſtichis, corolla connato-tubuloſa. *wurmbeum.*
Wurmbea capenſis. Linn. Syſt. 348.
M. foliis ovato lanceolatis, corolla reflexa. *viride.*
M. foliis enſiformibus cucullatis, floribus ſpicatis, petalis unguiculatis. *ciliatum.*
M. foliis trigonis glabris, floribus ſpicatis. *triquetrum.*

TRIGLOCHIN.

T. capſulis ſexlocularibus ovatis. *maritimum.*
T. radice bulboſa fibris obtecta. *bulboſum.*

TRIGYNIA.

RUMEX.

R. foliis lanceolatis reflexo-marginatis, caule angulato. *lanceolatus.*
R. foliis obovatis obtuſis, valvulis graniferis. *ſpathulatus.*
R. foliis cordatis glabris, ſupremis lanceolatis, valvulis integris nudis. *aquaticus.*
R. foliis cordato-ovatis, calycibus ſpineſcentibus. *ſpinoſus.*
R. foliis ſagittatis obtuſis, caule curvato-erecto. *tuberoſus.*
R. foliis ſagittatis acuminatis, caule flexuoſo. *ſagittatus.*
R. foliis haſtatis auriculis ſimplicibus. *acetoſella.*

SMILAX.

S. caule inermi angulato, foliis inermibus ovatis ſeptemnerviis. *herbacea.*

CLASSIS VII.

HEPTANDRIA.

LIMEUM.

africanum. L. foliis ovato-lanceolatis subpetiolatis.
capense. L. foliis ovatis sessilibus.
æthiopicum. L. foliis lineari-lanceolatis.

CLASSIS VIII.

OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

ERICA.

* *muticæ.*

✣ *foliis oppositis:*

E. mutica foliis oppositis lanceolatis glabris, floribus ternis, calyce colorato. *tenuifolia.*

✣✣ *foliis ternis:*

E. mutica foliis ternis lanceolatis glabris, floribus umbellatis, bracteis petiolatis coloratis obvallatis. *bracteata.*

E. mutica foliis ternis linearibus glabris, floribus umbellatis, corollæ tubo globoso, limbo campanulato. *Thunbergii.*

E. mutica foliis ternis lanceolatis ciliatis, floribus racemosis secundis tetragonis. *tetragona.*

E. mutica foliis ternis lanceolatis glabris, floribus umbellatis campanulatis, caule decumbente. *petiolata.*

E. mutica foliis ternis trigonis glabris, floribus racemosis globosis, ramis tomentosis. *axillaris.*

E. mutica foliis ternis oblongis serratis, floribus umbellatis, bracteis imbricatis, antheris exsertis. *imbricata.*

E. mutica foliis ternis ovatis imbricatis serratis glabris, capitulis terminalibus erectis. *serrata.*

E. mutica foliis ternis lanceolatis imbricatis glabris, floribus subracemosis. *glabra.*

E. mutica foliis ternis trigonis glabris, floribus umbellatis, bracteis ovatis laxis, antheris inclusis. *melanthera.*

E. mutica foliis ternis trigonis glabris, floribus umbellatis, antheris exsertis albis. *leucanthera.*

Plumosa. E. mutica foliis ternis trigonis glabris, floribus capitatis, bracteis imbricatis.

altera. E. mutica foliis ternis trigonis pilosis, floribus lateralibus, calyce villoso.

pygmæa. E. mutica foliis ternis linearibus piloso-hispidis, floribus racemosis cernuis.
Blaria pygmæa. Linn. Syst. 154.

capitata. E. mutica foliis ternis ovatis hirsutis, floribus umbellatis, calycibus lanatis.

passerinæ. E. mutica foliis ternis ovatis glabris, floribus subsolitariis, calycibus tomentosis.

tecta. E. mutica foliis ternis oblongis hispidis, floribus ternis, calycibus ciliatis.

virgata. E. mutica foliis ternis oblongis scabris, floribus ternis globosis, calycibus integris, stylo exserto.

ciliaris. E. mutica foliis ternis ovatis ciliatis, floribus axillaribus campanulatis, calycibus ciliatis.

hispida. E. mutica foliis ternis ovatis integris, floribus umbellatis globosis, calycibus integris.

Petiverii. E. mutica foliis ternis linearibus glabris, floribus terminalibus solitariis cylindricis, bracteis imbricatis.

Plukenetii. E. mutica foliis ternis linearibus glabris, floribus racemosis cylindricis, bracteis remotis.

*** *foliis quaternis pluribusve:*

cephalotes. E. mutica foliis senis lanceolatis, floribus verticillato-capitatis clavatis.

pulchella. E. mutica foliis senis lanceolatis, floribus axillaribus tubuloso-campanulatis.

erecta. E. mutica foliis senis linearibus secundis, floribus axillaribus clavatis villosis.

spinea. E. mutica foliis senis lineari-lanceolatis, floribus verticillatis clavatis glabris.

coccinea. E. mutica foliis senis lanceolatis, floribus racemosis clavatis villosis.

grandiflora. E. mutica foliis quaternis linearibus glabris, floribus racemosis clavatis glabris.

cylindrica. E. mutica foliis quaternis trigonis glabris, floribus terminalibus cylindricis glabris.

E. mu-

E. mutica foliis quaternis trigonis glabris, floribus terminalibus solitariis curvatis clavatis glabris. *curviflora.*

E. mutica foliis quaternis trigonis ciliatis, floribus terminalibus solitariis curvatis clavatis hirsutis. *tubiflora.*

E. mutica foliis quaternis ovatis glabris, floribus terminalibus solitariis hirsutis. *inconspicua.*

E. mutica foliis quaternis lincaribus glandulosopilosis, floribus clavatis glabris, calycibus hispidis. *glandulosa.*

E. mutica foliis quaternis trigonis ciliatis, floribus terminali-subsolitariis. *transparens.*

E. mutica foliis quaternis oblongis ciliato-serratis, floribus cylindricis villosis, calycibus serratis. *cerinthoides.*

E. mutica foliis quaternis oblongis ciliato-serratis, floribus campanulatis calycibusque strigosis. *Sparrmanni.*

E. mutica foliis quaternis oblongis serratis villosis, floribus cylindricis viscosis. *Masson.*

E. mutica foliis quaternis trigonis ciliatis, floribus ventricosis glabris. *ventricosa.*

E. mutica foliis quaternis trigonis glabris, floribus capitatis, calycibus integris. *fastigiata.*

E. mutica foliis quaternis trigonis glabris, floribus capitatis, calycibus ciliatis. *comosa.*

E. mutica foliis quaternis trigonis glabris, floribus capitatis, calycibus serratis. *dentata.*

E. mutica foliis quaternis trigonis glabris, floribus racemosis campanulatis, calyce rudi ciliato. *viscaria.*

E. mutica foliis quaternis lanceolatis glabris, floribus caducis, caule flexuoso debili. *caduca.*

E. mutica foliis quaternis ovatis subciliatis, floribus umbellatis, caule flexuoso erecto. *purpurea.*

Blæria purpurea. Linn. Syst. 154.

E. mutica foliis quaternis ovatis glabris, florum capitulis cernuis. *articulata.*

Blæria articulata. Linn. Syst. 154.

E. mutica foliis quaternis lanceolatis ciliato-scabris, capitulis erectis. *fasciculata.*

ſcabra. E. mutica foliis quaternis lanceolatis piloſo-hiſpidis, florum capitulis erectis, corollis clavatis.

blæria. E. mutica foliis quaternis oblongis villoſo-ſcabris, capitulis erectis, corollis campanulatis. *Blæria ericoides. Linn. Syſt. 154.*

hirſuta. E. mutica foliis quaternis lanceolatis ſcabris piloſis, calycibus lanatis.

racemoſa. E. mutica foliis quaternis lanceolatis villoſis, floribus racemoſis globoſis, calycibus tomentoſis.

cubica. E. mutica foliis quinis trigonis incurvis glabris, floribus umbellatis globoſis, calyce colorato carinato.

** *Ariſtatæ.*

† *foliis oppoſitis:*

glutinoſa. E. ariſtata foliis oppoſitis ſparſisque lincaribus ciliato-glandulosis.

lutea. E. ariſtata foliis oppoſitis lincari-trigonis glabris.

†† *foliis ternis:*

paniculata. E. ariſtata foliis ternis trigonis glabris, floribus lateralibus aggregatis, caule erecto.

depreſſa. E. ariſtata foliis ternis oblongis glabris, floribus ſubracemoſis, caule decumbente.

halicacaba. E. ariſtata foliis ternis lanceolatis glabris, floribus ſolitariis, caule decumbente.

Monſoniana. E. ariſtata foliis ternis ovatis glabris, floribus ſolitariis, caule erecto.

nigrita. E. ariſtata foliis ternis oblongis glabris, floribus ternis, bracteis acutis imbricatis.

vegerminans. E. ariſtata foliis ternis lincaribus glabris, floribus racemoſis, caule erecto.

urceolaris. E. ariſtata foliis ternis lanceolatis ſubtus tomentoſis, floribus ſubracemoſis villoſis.

hirta. E. ariſtata foliis ternis linearibus hiſpidis, floribus umbellatis, calyce ſcabro rudi.

bicolor. E. ariſtata foliis ternis ovatis ſcabris, floribus ternis cernuis glabris, calyce villoſo coloruto.

articularis. E. ariſtata foliis ternis ovatis glabris, floribus racemoſis, caule erecto.

E. ari-

E. aristata foliis ternis ovatis ciliatis, floribus axillaribus, caule decumbente. *planifolia.*

E. aristata foliis ternis ovatis subtus tomentosis, floribus subumbellatis, caule erecto. *marifolia.*

E. aristata foliis ternis quaternisque linearibus scabris, floribus umbellatis villosis. *pubescens.*

††† *foliis quaternis pluribusve:*

E. aristata foliis ternis quaternisque trigonis glabris, floribus umbellatis, calyce ciliato. *persolata.*

E. aristata foliis quaternis oblongis glabris margine scabris, floribus aggregatis terminalibus. *glabella.*
Blaeria purpurea. Berg. Pl. Cap. 34.

E. aristata foliis quaternis glabris, calyce lacero-ciliato. *plumosa.*
Blaeria ciliaris. Linn. Syst. 154.

E. aristata foliis quaternis lanceolatis ciliatis, floribus racemosis. *arborea.*

E. aristata foliis quaternis lanceolatis hirsutis, floribus umbellatis, calyce villoso reflexo. *florida.*

E. aristata foliis quaternis linearibus ciliatis, floribus umbellatis, calyce naviculari apice ciliato glabro. *pilulifera.*

E. aristata foliis quaternis linearibus glabris, floribus umbellatis ventricosis, calyce subulato glabro. *inflata.*

E. aristata foliis quaternis lanceolatis glabris, floribus racemosis cylindricis, calyce ovato ferrato. *abietina.*

E. aristata foliis senis lanceolatis glabris, floribus umbellatis, calyce subulato glabro. *mammosa.*

E. aristata foliis senis oblongis ciliatis, floribus verticillatis, calyce ciliato. *empetrifolia.*

E. aristata foliis senis lanceolatis glabris, floribus verticillatis, calyce petiolato integro. *spicata.*

E. aristata foliis octonis linearibus truncatis squarrosis, floribus umbellatis. *octophylla.*

*** *Cristatæ.*

† *foliis sparsis:*

E. cristata foliis oblique sparsis linearibus truncatis glabris. *obliqua.*

✣ *foliis ternis:*

gnaphalodes. E. crista foliis ternis ovatis integris glabris, floribus ternis glabris, calyce bracteisque navicularibus coloratis.

mucosa. E. crista foliis ternis ovatis serratis glabris, floribus umbellatis viscosis, calyce ovato colorato.

corifolia. E. crista foliis ternis lanceolatis integris glabris, floribus umbellatis glabris, calyce navicolari inflato.

calycina. E. crista foliis ternis ovatis integris glabris, floribus umbellatis glabris, calyce navicolari truncato cuspidato.

triflora. E. crista foliis ternis subulatis glabris, floribus subternis, calyce ovato æquante, caule hispido.

Bergiana. E. crista foliis ternis lanceolatis scabris, floribus subternis, calyce reflexo ciliato.

formosa. E. crista foliis ternis ovatis integris glabris, floribus umbellatis sulcatis, calyce patenti integro.

rubens. E. crista foliis ternis linearibus integris glabris, floribus umbellatis globosis, calyce lanceolato brevi, ramis glabris.

incarnata. E. crista foliis ternis ovatis integris glabris, floribus umbellatis ovatis, calyce integro, ramis villosis.

✣✣ *foliis quaternis:*

ramentacea. E. crista foliis quaternis trigonis integris, floribus umbellatis globosis, calyce lanceolato brevi.

margaritacea. E. crista foliis quaternis trigonis integris, floribus umbellatis campanulatis, calyce trigono subæquante.

baccans. E. crista foliis quaternis linearibus serrulatis, floribus umbellatis, calyce ovato æquante.

physodes. E. crista foliis quaternis linearibus, floribus umbellatis viscosis, calyce ovato brevi.

cernua. E. crista foliis quaternis ovatis ciliatis, floribus capitatis, calyce ciliato.

E. cri-

E. crifiata foliis quaternis ovatis fertulatis fquar- *retorta.*
rofis, floribus umbellatis vifcofis.

GRUBBIA.

G. *rofmarinifolia*

OENOTHERA.

O. foliis lanceolatis villofis, caule angulato *villofa.*
hirfuto.

EPILOBIUM.

E. foliis alternis lanceolatis ferratis hirfutis. *villofum.*

PASSERINA.

P. foliis teretibus truncatis quadrifariis, floribus *glomerata.*
capitatis.
Lachnæa glomerata. Linn. Syft. 374.
P. foliis trigonis acutis quadrifariis, floribus ra- *filiformis.*
cemofis.
P. foliis linearibus convexis imbricatis, capitu- *eriocephala.*
lis lanatis.
P. foliis trigonis quadrifariis, capitulis lanatis. *cephalophora.*
P. foliis linear-lanceolatis glabris tricoftatis, *linoides.*
floribus terminalibus folitariis.
P. foliis lanceolatis glabris tricoftatis, floribus *nervofa.*
capitatis.
P. foliis lanceolatis lævibus, floribus termina- *uniflora.*
libus folitariis.
P. foliis lanceolatis glabris lævibus, floribus *capitata.*
capitatis.
P. foliis lanceolatis glabris quinquenerviis, flo- *fetofa.*
ribus capitatis extus fetofis.
P. foliis ovatis pilofis, floribus capitatis, ra- *laxa.*
mis laxis.
P. foliis ovatis hirfutis, floribus capitatis, ra- *ftricta.*
mis rigidis.
P. foliis lanceolatis ciliatis, floribus fubfolitariis. *ciliata.*
P. foliis ovatis villofis, floribus lateralibus fef- *fpicata.*
filibus.

P. fo-

Anthyllaides. P. foliis oblongis villosis, floribus capitatis.
pulandra. P. foliis ovatis hirsutis, spicis ovatis terminalibus.

GNIDIA.

capitata. G. foliis sparsis ovato-lanceolatis glabris, floribus capitatis bracteis obvallatis.
filamentosa. G. foliis ovatis glabris, floribus capitatis, filamentis capillaribus.
laevigata. G. foliis oppositis ovatis glabris, floribus terminalibus subcapitatis.
pinifolia. G. foliis sparsis trigonis, floribus umbellato-capitatis.
simplex. G. foliis lineari-lanceolatis glabris, floribus capitatis, ramis erectis.
biflora. G. foliis sparsis lanceolatis glabris, floribus lateralibus binis, ramis divaricatis.
carinata. G. foliis lanceolatis obtusis carinatis glabris, floribus capitatis.
scabra. G. foliis lanceolatis acutis scabris, floribus capitatis.
racemosa. G. foliis obovato-lanceolatis laxis glabris, floribus racemosis axillaribus.
oppositifolia. G. foliis oppositis lanceolatis tomentosis, floribus terminalibus.
fericea. G. foliis oppositis ovatis tomentosis, floribus terminalibus.
tomentosa. G. foliis sparsis ovatis pilosis scabris, floribus capitatis.
argentea. G. foliis sparsis obovatis tomentoso-argentris, floribus capitatis.
imbricata. G. foliis ovatis quadrifariis tomentosis, floribus capitatis.

STRUTHIOLA.

erecta. S. foliis linearibus glabris, ramis glabris tetragonis.
ovata. S. foliis ovatis glabris, ramis glabris rugosis.
virgata. S. foliis lanceolatis striatis, summis ciliatis, ramis pubescentibus.
nana. S. foliis linearibus obtusis pilosis, floribus terminalibus fasciculatis tomentosis.

DODONÆA.

D. foliis linearibus. *angustifolia.*

POPULUS.

P. foliis subrotundis dentato-angulatis subtus *alba.*
tomentosis.

DIGYNIA.

GALENIA.

G. foliis linearibus, caule erecto. *linearis.*
G. foliis ovatis canaliculatis squarrosis, caule *procumbens.*
decumbente.

WEINMANNIA.

W. foliis ternatis: foliolis ellipticis serratis glabris. *trifoliata.*

TRIGYNIA.

POLYGONUM.

P. floribus hexandris digynis, foliis ovatis undulatis. *atraphaxoidis.*
Atraphaxis undulata. Linn. Syst. 345.
P. floribus hexandris trigynis, spicis virgatis, *barbatum.*
stipulis truncatis setaceo-ciliatis, foliis lanceolatis ciliatis.
P. floribus octandris trigynis axillaribus, foliis *marittimum.*
oblongis, caule suffrutescente.

FORSKOHLEA.

F. foliis ovatis dentatis. *candida.*

CLASSIS IX.

ENNEANDRIA.

MONOGYNIA.

LAURUS.

nobilis. L. foliis lanceolatis marginatis integris glabris, floribus axillaribus paniculatis.

CASSYTHA.

filiformis. C. filiformis scandens.

DIGYNIA.

MERCURIALIS.

annua. M. caule brachiato, foliis glabris, floribus spicatis.

CLASSIS X.

DECANDRIA.

MONOGYNIA.

SOPHORA.

S. foliis ſimplicibus ovatis hirſutis. *cordata.*
S. foliis ſimplicibus ovatis reticulatis, floribus axillaribus calyptratis. *calyptrata.*
S. foliis ſimplicibus ovatis tomentoſis, floribus axillaribus, pedunculis folio longioribus. *pedunculata.*
S. foliis ſimplicibus oblongis tomentoſis, floribus axillaribus ſubſeſſilibus. *biflora.*
S. foliis ſimplicibus obovatis ſericeis, floribus axillaribus, pedunculis longitudine folii. *rotundifolia.*
S. foliis ternatis petiolatis: foliolis ovatis ſericeis. *trifoliata.*
S. foliis ternatis ſeſſilibus: foliolis lanceolatis ſericeis. *ternata.*
S. foliis ternatis ſeſſilibus: foliolis linearibus. *geniſtoides.*
S. foliis pinnatis: foliolis lanceolatis tomentoſis. *capenſis.*

CASSIA.

C. foliis multijugis: foliolis linearibus, caule flexuoſo-erecto villoſo. *capenſis.*

EKEBERGIA.

E. *capenſis.*

MELIA.

M. foliis bipinnatis. *azedarach.*

TRIBULUS.

T. foliis ſubſexjugis ſubæqualibus, ſeminibus quadricornibus. *terreſtris.*

SCHOTIA.

S. *afra.*

ZYGOPHYLLUM.

cordifolium. Z. foliis simplicibus oppositis cordato orbiculatis.
fabago. Z. foliis conjugatis petiolatis: foliolis obovatis, caule herbaceo.
morgsana. Z. foliis conjugatis subpetiolatis: foliolis obovatis, caule fruticoso.
sessilifolium. Z. foliis conjugatis sessilibus: foliolis lanceolato-ovalibus margine scabris, caule fruticoso.
spinosum. Z. foliis conjugatis sessilibus: foliolis linearibus carnosis, caule fruticoso.
microphyllum. Z. foliis conjugatis sessilibus: foliolis ovatis integris, caule fruticoso.
retrofractum. Z. foliis conjugatis petiolatis: foliolis ovatis, caule fruticoso ramisque retrofractis.

CODON.

Royeni. C.

AUGEA.

capensis. A.

TRIANTHEMA.

humifusa. T. foliis lanceolatis, caule frutescente teretiusculo.
anceps. T. foliis lanceolatis, caule frutescente ancipiti.

DIGYNIA.

SCLÆRANTHUS.

annuus. S. calycibus fructus patulis.

ROYENA.

lucida. R. foliis ovatis villosis.
villosa. R. foliis cordatis oblongis subtus tomentosis.
glabra. R. foliis oblongis acutis glabris planis.
pallens. R. foliis oblongis obtusis glabris margine revolutis.
hirsuta. R. foliis lanceolatis hirsutis.
polyandra. R. foliis ovatis subtus tomentosis.

CUNONIA.

C. *capensis.*

DIANTHUS.

D. floribus solitariis, squamis calycinis senis *crenatis.*
lanceolatis, corollis crenatis.

D. floribus solitariis, squamis calycinis quater- *incurvus.*
nis ovatis brevissimis, petalis integris.

D. caulibus unifloris, corollis integris, calyci- *cespitosus.*
nis squamis quatuor lanceolatis, foliis tri-
gonis.

D. caulibus unifloris, squamis calycinis quater- *scaber.*
nis lanceolatis, petalis crenatis.

TRIGYNIA.

ARENARIA.

A. foliis filiformibus, stipulis membranaceis va- *rubra.*
ginantibus.

SILENE.

S. floribus racemosis secundis, petalis integris, *gallica.*
caule hispido.

S. petalis bifidis, foliis obovatis carnosis hirsu- *crassifolia.*
tis, racemo secundo.

S. petalis bifidis, calycibus fructiferis ovatis vil- *bellidifolia.*
losis, foliis piloso-asperis.

S. petalis bifidis, calycibus decem angularibus, *noctiflora.*
caule trichotomo.

S. hirsuta floribus racemosis secundis cernuis, *cernua.*
foliis linearibus.

KIGGELARIA.

K. *africana.*

PENTAGYNIA.

SPERGULA.

S. foliis verticillatis, floribus pentandris. *pentandra.*

AGROSTEMA.

githago. A. hirsuta calycibus corollam æquantibus, petalis integris nudis.

LYCHNIS.

dioica. L. floribus dioicis.

BERGIA.

glomerata. B. foliis obovatis crenatis, floribus glomeratis.

OXALIS.

* *foliis simplicibus.*

monophylla. O. foliis ovatis indivisis.

** *foliis ternatis.*

✣ *acaules:*

minuta. O. scapis unifloris, foliis ternatis: foliolis oblongis glabris.

punctata. O. scapis unifloris, foliis ternatis, foliolis obcordatis punctatis.

natans. O. scapis unifloris, foliis ternatis: foliolis obcordatis glaucis.

lanata. O. scapis unifloris, foliis ternatis: foliolis obcordatis hirsutis.

compressa. O. scapis unifloris, foliis ternatis: foliolis obcordatis ciliatis, petiolis compressis.

purpurea. O. scapis unifloris, foliis ternatis, foliolis subrotundis ciliatis.

caprina. O. scapis umbelliferis, foliis ternatis glabris, floribus erectis.

cernua. O. scapis umbelliferis, foliis ternatis glabris, floribus plerisque clausis cernuis.

fericea. O. scapis umbelliferis, foliis ternatis tomentosis.

✣✣ *caulescentes.*

repens. O. caule repente, pedunculis unifloris, foliis ternatis: foliolis obcordatis hirtis.

bifida. O. caule erecto glabro, pedunculis unifloris, foliis ternatis: foliolis semibifidis.

O. cau-

O. caule erecto glabro, pedunculis unifloris, foliis ternatis: foliolis oblongis excisis glabris. *glabra.*

O. caule erecto hirto, pedunculis unifloris, foliis ternatis subsessilibus: foliolis oblongis excisis glabris. *hirta.*

O. caule erecto hirto, pedunculis unifloris, foliis ternatis: foliolis linearibus callosis. *versicolor.*

**** foliis digitatis:*

O. foliis multifidis glabris. *flava.*

O. foliis multifidis hirtis. *tomentosa.*

CERASTIUM.

C. foliis cordatis sessilibus, floribus solitariis, fructibus pendulis. *aquaticum.*

C. erectum villoso-viscosum. *viscosum.*

COTYLEDON.

C. foliis cuneatis carnosis hirtis, floribus paniculatis hirsutis. *cuneata.*

C. foliis obovatis carnosis integris, floribus spicatis ternis sessilibus. *triflora.*

C. foliis oblongo-ovatis sessilibus, floribus divaricato-paniculatis, caule fruticoso ramoso. *paniculata.*

C. foliis lineari-oblongis carnosis glabris, floribus paniculatis. *purpurea.*

C. foliis carnosis subteretibus hirsutis, floribus paniculatis, caule hirsuto. *teretifolia.*

C. foliis carnosis oppositis tereti-ovatis glabris, floribus pedunculatis. *papillaris.*

C. foliis alternis tereti-ovatis glabris, floribus alternis pedunculatis. *mammillaris.*

C. foliis teretibus, floribus paniculatis, caule fruticoso. *cacalioides.*

C. foliis teretibus, floribus reticulato-paniculatis, caule fruticoso. *reticulata.*

APPENDIX.

DIOSMA.

virgata. D. foliis trigonis obtusis punctatis glabris, floribus subracemosis *laxigiatis.*

alba. D. *foliis trigonis acutis punctatis, bracteis calyceque ciliatis.*

obtusata. D. *foliis* trigonis acutis punctatis, calyce petalisque ciliatis, ramulis pubescentibus.

pectinata. D. foliis trigonis acutis punctatis ciliatis.

bisulca. D. foliis trigonis acutis hirsutis, racemis terminali-subumbellatis.

latifolia. D. foliis ovatis crenatis pubescentibus, pedunculis lateralibus *unifloris*, ramis subtomentosis.

Diosma latifolia. Linn.

Diosma odoratissima. Montin Act. Lundens.

orbicularis. D. foliis orbiculatis, ramis villosis.

MAUHLIA ensifolia.

ACHARIA Tragodes.



SCHREBERA *schinoides*.

Jn. Echarius pinxit

Jn. Merd. Sc.